

CHRONIQUE ORNITHOLOGIQUE VALAISANNE: DE L'HIVER 1990-1991 A L'AUTOMNE 1993

Rapport de la Centrale ornithologique valaisanne,
par Bertrand Posse¹

ZUSAMMENFASSUNG

Diese Zusammenstellung ist die erste, die sämtliche Walliser Beobachtungen, die der Schweizerischen Vogelwarte und der Walliser ornithologischen Zentrale zur Verfügung gestellt wurden, berücksichtigt. Sie wurde noch ergänzt durch zusätzliche Daten von der Centrale ornithologique romande von *Nos Oiseaux*. Daraus resultiert eine Zusammenfassung gespickt voll von Ereignissen, welche die berücksichtigten Jahre prägten. Die Form dieser Zusammenstellung wurde etwas verändert. Sie sollte leserfreundlicher werden und trotzdem die detaillierten Informationen beibehalten. So wurden die Herbst-Zusammenstellungen gestrafft, indem nur die wichtigsten Beobachtungen vom col de Bretolet aufgenommen wurden. Die einzelnen Ergebnisse der Greifvogelzählung 1992 befinden sich dafür im Anhang. Als weitere Neuerung muss die von der Schweizerischen Avifaunistischen Kommission 1992 eingeführte neue Liste derjenigen Vogelarten, die einer detaillierten Beschreibung würdig sind, erwähnt werden. Diese Liste legt im übrigen nun auch jahreszeitliche und gebietsbezogene Bedingungen festlegt.

INTRODUCTION

Ce collationnement est le premier qui intègre l'ensemble des observations valaisannes à disposition de la Station ornithologique suisse et de la Centrale ornithologique valaisanne, complété par des données issues de la Centrale ornithologique romande de *Nos Oiseaux*; il apporte de ce fait un résumé relativement fourni des événements qui ont marqué les années prises en considération. Pour les raisons déjà évoquées dans les pages précédentes, la forme de cette chronique change un peu et espère améliorer les commodités de lecture, tout en conservant une information détaillée. Dans ce but également, afin d'alléger les synthèses automnales, seules les données importantes provenant du col de Bretolet ont été intégrées dans le texte; le détail des

¹ Rue du Simplon 11, 1920 Martigny

comptages de rapaces en 1992 se trouvent en annexe à la fin du rapport. Comme dernière modification à signaler, il faut relever celles intervenues au sein de la Commission de l'avifaune suisse qui a publié en 1992 une nouvelle liste des oiseaux méritant une description détaillée, suivant l'espèce rencontrée, la date d'observation et le lieu.

Abréviations des noms d'observateurs

A: rA = R. Arlettaz — **B:** dBd = D. Baud; phB = Ph. Baumann; paB = P. Bérode; cB = C. Bottani — **C:** gCa = G. Carron; jeC = J. Curchod — **D:** gaD = G. Delaloye; mD = M. Desfayes; hDu = H. Duperrex — **E:** mEi = M. Eichenberger; jEr = J. Erard — **F:** jeF = J. Fournier — **G:** Gey = C. Geyer; Gun = E. Gunzinger — **H:** cHa = Ch. Haag — **J:** adJ = A. Jordi — **K:** cK = Ch. Keim; Ker = P. Kernen — **L:** Leu = M. Leuenberger; aLu = A. Lugon; rLu = R. Lugon — **M:** liM = L. Maumary; hMe = H. Messerknecht — **O:** paO = P.-A. Oggier — **P:** beP = B. Posse; — **R:** eRe = E. Revaz; Rey = J. Rey — **S:** Sal = P. Salzgeber; Sch = M. Schaub; peS = P. Schneeberger; ES = E. Sermet; aSi = A. Sierro; iSi = I. Simonetta; jS = J. Strahm; Str = B. Straub; sSt = St. Strebel — **T:** rhT = R. & H. Tschanz; jcT = J.-Cl. Tièche — **U:** pUn = P. Undeland — **V:** rV = R. Voisin; bV = B. Volet — **W:** Wid = E. Widmann; tWY = Th. Wyer — **Z:** Zur = St. Zurbriggen.

En plus des personnes citées ci-dessus, plusieurs données proviennent d'ornithologues observant occasionnellement dans le canton: elles seront suivies dans ce cas du nom complet de leur auteur.

Il faut également ajouter d'autres abréviations à la liste présentée plus haut; elles concernent des organismes qui ont aimablement mis à disposition leurs données:

CAvS = Commission de l'avifaune suisse. — G = observations provenant du fichier Gypaète. — NO = observations de la Centrale ornithologique romande, non encore publiées dans *Nos Oiseaux*. — S = observations issues des fichiers de la Station ornithologique, sans mention du nom d'observateur.

Autres abréviations utilisées dans le texte: ad. = adulte; env. = environ; f. = femelle; imm. = immature; ind. = individu; j. ou juv. = jeune, juvénile; m. = mâle; max. = maximum; subad. = subadulte.

Nous ne pourrions aborder les premières synthèses sans avoir remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont collaboré à ce rapport: l'ensemble des ornithologues, et tout particulièrement ceux qui ont accepté de collaborer à la Centrale valaisanne, pour avoir mis à disposition leurs données, Hans Schmid, de la Station ornithologique suisse, pour sa disponibilité, ses traductions allemandes et ses nombreux services, Raphaël Arlettaz, pour les données du Réseau Gypaète Valais et Didier Baud, pour les comptages de rapaces migrateurs en automne 1992 à Bretolet.

L'HIVER 1990-1991

Les premiers prémisses de l'hiver ont entraîné une **fuite importante de Vanneaux** et des **regroupements massifs de Fringilles** à mi-décembre. Les périodes de neige en plaine suivies de gels nocturnes intenses ont tout de même permis à quelques espèces d'hiverner: c'est ainsi que l'on signale une **abondance exceptionnelle de Grèbes huppés** et plusieurs **tentatives d'hivernage de Traquets pâtres**.

*Die ersten Vorboten des Winters 1990/91 brachten eine imposante **Flucht von Kiebitzen** und **grosse Ansammlungen von Finkenartigen** um Mitte-Dezember. Zwar*

gab es Abschnitte mit Schnee bis in die Niederungen, gefolgt von grosser Kälte, doch wagten trotzdem einige Arten den Versuch, zu überwintern: So wurde eine aussergewöhnliche Zahl von Haubentauchern und mehrere Überwinterungsversuche von Schwarzkehlchen gemeldet.

Grèbe castagneux, Zwergtaucher: quelques hivernants malgré le gel des eaux calmes: 5 à 10 ind. à Grône (aLu, Wid) et 1 à Martigny, 2 à Saillon sur des canaux (beP). —

Grèbe huppé, Haubentaucher: 2 ind. à Martigny le 15.12 n'ont pas été retrouvés par la suite (beP); à Granges, 7 à 14 ind. sont vus entre le 22.12 et le 25.1, puis abandonnent le site suite au gel (Wid; aSi; aLu, Rey); enfin, 1 ind. le 26.1 à Sion (Wid). Hivernage record.

Cormoran, Kormoran: de fin décembre à début mars, présence régulière de 1 à 4 ind. dans les régions de Martigny (beP; jeF) et de Grône (Wid, iSi, aLu, Rey), manifestation de l'expansion continue de l'espèce en Valais⁴; plus en aval, 1 le 20.1 à Saint-Maurice (paB).

Héron cendré, Graureiher: peu vu cet hiver: 2 en décembre-janvier entre Martigny et Charrat (beP), 1 le 30.12 à Leuk (aLu) et 2 à 4 à Grône en janvier (Wid; aLu).

Canard siffleur, Pfeifente: 1 m. le 1.12 à Grône (Wid). — **Sarcelle d'hiver, Krickente:** une dernière migratrice le 19.12 à Martigny (beP); une seule observation à Grône, le 11.1 (Rey). — Le **Canard colvert, Stockente** atteint à Grône des max. de 140 ind. le 8.12 et de 102 le 20.1 (aLu; Wid), puis disparaît après le 3.2 à cause du gel. — **Canard souchet, Löffelente:** 1 f. les 8 et 22.12 à Grône (aLu; Wid) a probablement tenté d'hiverner. — **Harle piette, Zwergsäger:** 1 m. les 25.2, 3 et 4.3 à Grône (iSi, aLu, Wid) est une apparition exceptionnelle pour le canton. Cette observation est à mettre en relation avec un mouvement de plus grande ampleur qui a touché la Suisse romande après la mi-février.

Gypaète, Bartgeier: un subadulte jusqu'au 15.2 dans la région de Fionnay (V. May, Ph. Maret G) et 1 imm. ou subad. le 27.1 à Liddes (St. Mettaz G). — **Busard Saint-Martin, Kornweihe:** nombreuses observations entre Evionnaz et Saillon, dont celles attestant l'hivernage complet d'un m. à Dorénaz (beP, eRe). Ailleurs, isolés le 4.1 à Montorge/Sion et le 5 à Saint-Léonard (Wid). A noter la présence insolite d'un m. le 3.2 à Fionnay, 2'600 m (P. Moret⁵).

Lagopède, Alpenschneehuhn: isolés ou en duo le 4.2 au-dessus de Brig-Glis, à 2'040 et 2'460 m, et les 4 et 6.2 au Simplon, 2'000 et 2'600 m (jcT).

Râle d'eau, Wasserralle: tentative d'hivernage à Grône où des cris sont entendus les 8 et 22.12 (aLu; Wid). — **Poule d'eau, Teichhuhn:** 2 hivernantes à Saillon et Martigny (beP); à Grône, les effectifs diminuent sous l'emprise du froid: de 11 ind. le 8.12 à 1 ind. le 28.12 (aLu; Wid), puis absence à cause du gel. — **Foulque, Blässhuhn:** un max. de 44 ind. est noté les 8.12 et 30.1 à Grône (aLu).

Vanneau huppé, Kiebitz: 1'200 ind. fuient la neige le 11.12 à Monthey (rV¹⁵); manifestation moins spectaculaire, mais à inclure dans ce mouvement, la présence de 18 ind. à Martigny entre le 15 et le 24.12 (beP).

Martin-pêcheur, Eisvogel: 1 le 3.2 à Collombey-Muraz (Str).

Hirondelle de fenêtre, Mehlschwalbe: découverte surprenante d'un cadavre le 10.2 à Martigny (Ph. Cuénoud⁵).

Pipit farlouse, Wiesenpieper: une seule donnée d'hivernage concerne 6 ind. le 28.12 à Valère/Sion (aSi).

Cincle, Wasseramsel: une donnée d'altitude, le 27.1 à Morgins 1'280 m (aLu).

Accenteur mouchet, Heckenbraunelle: plusieurs hivernants disséminés dans la plaine entre Martigny et Grône ainsi que sur le bas-coteau du Valais central (beP; Wid; Rey). — **Accenteur alpin, Alpenbraunelle:** sur le bas-coteau, notamment une

quinzaine le 26.12 à Valère/Sion (Wid); en altitude, 2 le 5.2 au Simplon 2'000 m (jcT, O. Hegg).

Rougequeue noir, Hausrötél: 1 attardé le 5.12 à Martigny, puis 1-3 hivernants à Fully (beP); 1 le 8.1 à Martigny (jeF). — **Traquet pâtre, Schwarzkehlchen:** l'automne relativement doux a entraîné plusieurs tentatives d'hivernage dans la région du Coude du Rhône: à Vernayaz, 1 ind. jusqu'au 1.12 (jeF, beP), à Dorénaz, 1-2 jusqu'au 9.12 et 2-3 à Martigny (beP). Une vague de froid intervenue dans la deuxième décennie de décembre a décimé la presque totalité des effectifs: 1 seul m. a survécu à Martigny où il a été vu pour la dernière fois le 2.2, lors d'une période de grands froids. — **Grive musicienne, Singdrossel:** 1 groupe de 8 ind. le 13.1 à Martigny (beP).

Fauvette à tête noire, Mönschgrasmücke: 1 le 20.1 en ville de Sion (aSi). — **Pouillot véloce, Zilpzalp:** 1 ind. le 16.12 à Sion (aLu).

Pie-grièche grise, Raubwürger: 1 ind. le 30.12 à Leuk (aLu).

Tichodrome, Mauerläufer: isolés au pied du coteau les 25.1 et 9.2 à Fully (beP) et le 14.3 à Granges (aLu).

Corbeau freux, Saatkrähe: quelques attardés ou tentatives d'hivernage au Coude du Rhône avec 5 ind. le 2.12 à Martigny et 2 à 3 les 15 et 23.12 à Dorénaz (beP).

Etourneau, Star: 40 ind. le 22.12 à Bramois (Wid) et 3 le 28 à Martigny (beP).

Pinson du Nord, Bergfink: arrivée massive à mi-décembre pour un total d'env. 500 ind. à Martigny (beP). — Quelques petits groupes de **Serins, Girlitzen:** 7 le 31.12 à Martigny (ra, beP), une dizaine le 4.1 à Montorge/Sion (Wid) et une vingtaine le 27.1 à Fully (beP). — **Venturon, Zitronenzeisig:** des chutes de neige jusqu'en plaine ont entraîné la descente d'oiseaux hivernant en montagne: une dizaine d'ind. le 15.12 à Saillon (jcP) puis 5 à 1 les 26 et 28.12 à Valère/Sion (Wid; aSi) et enfin 1 le 11.2 et 13 le 16 à Martigny (phB; beP); en moyenne montagne, observé à Lens et Miège (Rey). — **Chardonneret, Distelfink:** 10 le 15.12 à Saillon (jcP) sont les seuls du Coude du Rhône, alors que les hivernants sont bien disséminés dans la plaine du Valais central (Wid; Rey). — **Linotte, Hänfling:** une 100^e d'ind. hiverne à Dorénaz; à Martigny, plusieurs observations en décembre avec un max. de 300 les 15-16 (beP); en Valais central, une 20^e le 5.1 à Bramois (Wid). — **Sizerin, Birkenzeisig:** en plaine, 5 le 5.1 à Sion (Wid) et 9 le 11.2 à Martigny (phB, beP); vu également le 8.2 à Grône (Rey). — **Grosbec, Kernbeisser:** comme de coutume, très discret en hiver: 1 le 26.12 à Valère/Sion (Wid) et le 19.1 à Saillon (pUn).

Bruant zizi, Zaunammer: 5 à 6 hivernants en décembre à Valère/Sion (aSi, Wid); 3 m. le 11.2 à Martigny (phB, beP). — Quelques **Bruants fous, Zippammern** hivernent isolément ou par petits groupes sur le coteau de Fully (beP) et à Veyras (Rey). — **Bruant des roseaux, Rohrammer:** 1 à 5 hivernants à Martigny (beP) et une dizaine à Grône (aLu); autres localités: isolés à Ardon, Montorge/Sion et Aproz (Wid).

LE PRINTEMPS ET L'ETE 1991

Le printemps fut exceptionnellement clément jusqu'à mi-avril, qui marque le début de périodes prolongées de rafraîchissements jusqu'en juin. Les premières semaines printanières sont ainsi marquées par l'arrivée hâtive de plusieurs espèces; face au peu d'observations de hérons, il faut relever le bon passage du Grèbe huppé, de la Sarcelle d'été, du Harle bièvre, du Chevalier combattant, du Guépier et du Pipit à gorge rousse. Dans la cascade des mauvaises conditions météorologiques de ce printemps, celles du 3 juin ont apporté plusieurs observations insolites par la date et le

lieu dans la région de Martigny, notamment pour les Laridés. Enfin, nous noterons la **présence de 3 Circaètes** dans la région de Fully-Saillon, site souvent fréquenté depuis le milieu du siècle.

Der Frühling 1991 war bis Mitte April aussergewöhnlich mild, worauf bis Juni mehrere längere Kältewellen folgten. Die ersten Frühjahrswochen brachten eine frühe Ankunft verschiedener Kurzstreckenziehern. Wenigen Meldungen von Reiherern steht ein guter Durchzug von Haubentauchern, Knäkenten, Gänsesägern, Kampfpläuerern, Bienenfressern und Rotkehlpipepern gegenüber. In der Folge der verschiedenen Schlechtwetterperioden dieses Frühlings ist diejenige vom 3. Juni besonders bemerkenswert, brachte sie doch zu diesem ungewöhnlichen Zeitpunkt für die Region Martigny einige aus dem Rahmen fallende Beobachtungen, besonders von Lariden. Noch zu erwähnen bleibt die Anwesenheit von 3 Schlangennadlern in der seit der Jahrhundertmitte von dieser Art immer wieder aufgesuchten Gegend von Fully-Saillon.

Grèbe huppé, Haubentaucher: afflux remarquable au Coude du Rhône: 13 ind. se succédant entre le 3.3 et le 21.4 (beP); à Granges, 1 ind. les 20 et 22.4 (beP; Rey).

— **Grèbe à cou noir, Schwarzhalstaucher:** 2 le 8.4 à Granges (Rey) et 1 le 29.4 à Martigny (beP).

Grand Cormoran, Kormoran: il est difficile de séparer les hivernants attardés des migrateurs printaniers; toutefois, les premiers mouvements perceptibles semblent se profiler à début mars dans la région de Fully-Martigny où le dernier oiseau est observé le 11.5 (cK, beP); à Grône, 1 à 3 ind. s'attardent du 14.4 au 8.5 (Rey, iSi), puis dernière observation printanière, le 19.5 à Leuk (Sch).

Blongios nain, Zwergreiher: première observation hâtive le 24.4 à Leuk (D. Magnenat), avec max. de 3 le 19.5 (adJ, S. Birrer). — **Bihoreau, Nachtreiher:** 8 dates proviennent de Leuk, entre le 10.4 et le 31.5 (Sal, Rey, ...) et 1 de Fully, le 23.4 (beP). — **Aigrette garzette, Seidenreiher:** observée uniquement à Grône (29.4-3.5 et 18-27.5; iSi, Rey) et dans le Haut-Valais: 1 le 12.5 à Raron (rA, aLu, rLu, aSi). — **Héron pourpré, Purpureiher:** 6 ind. observés en trois localités seulement, à Martigny, Grône et Leuk, entre le 7.5 et le 4.6 (beP; iSi; jeF; ...). A noter 1 attardé ou erratique le 23.6 à Grône (M. Liberek⁶).

Cigogne blanche, Weissstorch: deux observations d'avril, le 7 en vol à Vernayaz (jeF) et le 15 à Saint-Maurice (jeC).

Canard chipeau, Schnatterente: 3 ind. le 5.4 à Grône (Wid). — **Sarcelle d'hiver, Krickente:** à Grône, passage max. de 10 ind. le 1.4 (jeC). — **Canard pilet, Spiessente:** le passage débute à Grône avec 2 ind. le 3.3 (aLu) et se termine avec le séjour d'une f. du 28.4 au 19.5 (iSi, aLu, Wid, Rey); ailleurs, 1 les 22-23.3 à Martigny (phB, beP). — **Sarcelle d'été, Knäkente:** un passage massif débute le 6.3 à Martigny avec l'arrivée de 21 ind. (beP), puis le 10, de 28 ind. à Leuk (Ker, tWy) et de 6 à Grône (Wid), et s'étire jusqu'au 12.5 à Ausserberg (Sal). Abondance exceptionnelle. — **Canard souchet, Löffelente:** présence régulière à Grône de 1-2 ind. entre le 7.3 et le 19.5 (Wid, iSi, aLu, ...); 1 m. du 5 au 7.4 à Martigny (beP, eRe). — **Nette rousse, Kolbenente:** 2 m. et 1 f. le 23.4 à Leuk (Rey), apparition rare dans le Haut-Valais. — **Fuligule milouin, Tafelente,** le 10.3 à Grône (Rey). — **Fuligule nyroca, Moorente:** 1 m. bagué, mais craintif et incapable de voler, le 10.7 à Brigerbad (Wid, beP) est peut-être échappé de captivité. — **Harle bièvre, Gänsesäger:** la région du Coude du Rhône est le théâtre d'observations de plus en plus fréquentes: 1 à 4 oiseaux sont observés régulièrement entre le 1.3 et le 6.5 (jeF, beP); plus en aval, 2 ind. sont vus le 9.4 à Saint-Maurice (beP) et 4 le 11 à Massongex puis le 11.5, 5 ind. à Vouvry et 3 à Massongex (hMe).

Bondrée, Wespenbussard: première le 8.5 à Châteauneuf (jeF). — Retour hâtif du **Milan royal, Rotmilan,** le 1.2 à Martigny (M. Juillard⁶) puis 1 le 27.3 (jeF, beP) et

deux observations d'attardés en mai, le 4 à Port-Valais (pUn) et le 30 à Dorénaz (beP). — **Gypaète, Bartgeier**: une seule observation, le 1.7 sur Fionnay (F. Perraudin G). — **Circaète, Schlangenadler**: entre le 8.7 et le 25.8, trois oiseaux se partagent le coteau de Fully-Saillon, dont 1 ind. complètement blanc (beP, hDu, jeF, eRe, ...), homologués CAVS. — **Busard des roseaux, Rohrweihe**: un passage bien fourni (36 observations pour 6 localités) débute le 19.3 à Grône (Wid), où l'espèce est la plus fréquente, et s'achève le 9.6 à Ardon (2 ind.; aSi^{6,7}). — **Busard Saint-Martin, Kornweihe**: 1 le 4.3 à Grône (Wid), 1-2 du 18.3 au 7.4 à Vouvry (beP, eRe) puis 1 attardé le 10.5 à Martigny (jeF). — **Busard cendré, Wiesenweihe**: au moins 4 ind. observés, dans la région de Leuk uniquement, entre le 18 et le 26.5 (adJ; beP, eRe, ...), alors que l'espèce est abondamment observée dans le nord de la Suisse.

Balbuzard, Fischadler: 1 ind. séjourne à Grône entre le 17 et le 21.4 (Rey, iSi, Wid, ...).

Faucon kobez, Rotfussfalke: 1 m. les 29-30.4 à Collonges (beP, jeF, eRe) ouvre un faible passage, remarqué le 5.5 à Sion (Wid), le 18 à Leuk (P. Mägerle, ...) et le 20 à Rotafen (adJ, ...). — **Faucon hobereau, Baumfalke**: 5 ind. passent entre le 19.4 et le 2.6 à Martigny (beP); ailleurs, des isolés à Leuk les 12, 18 et 19.5 (adJ; beP, ...) et Finges le 17.5 (aLu).

Marouette ponctuée, Tüpfelsumpfhuhn: une seule observation, le 29.3 à Grône (Wid). — **Marouette poussin, Kleines Sumpfhuhn**: apparition insolite d'une f. les 3-4.6 à Martigny (beP).

Grue cendrée, Kranich: 5 ind. le 19.3 à Vouvry (hMe), 5^e observation valaisanne.

Oedicnème, Triel: 1 ind. le 27.3 à Martigny (phB, jeF, cK, beP), fait partie de la petite vague qu'â connu la Suisse ce printemps.

Petit Gravelot, Flussregenpfeifer: premier hâtif le 10.3 à Martigny, puis max. de 6 les 28-29.4 (beP); à Grône, observé les 20.3, 20 et 22.4 (Rey; Sal, tWy; iSi), puis à Baltschieder les 21 et 25.4 (Sal; Zur) et 3 à Finges le 25.4 (D. Magnenat). — **Grand Gravelot, Sandregenpfeifer**: deux observations ce printemps pour ce visiteur occasionnel, le 19.3 à Grône (iSi) et le 1.5 à Martigny (phB, jeF, beP, eRe). — **Vanneau huppé, Kiebitz**: passage très médiocre (9 observations en 4 localités), hormis un groupe de 100 le 10.3 à Leuk (tWy).

Chevalier combattant, Kampfläufer: 9 ind. le 25.3 à Vouvry (beP) puis 3 à 1 du 25 au 30.3 à Martigny (beP, Wid), 2 à Grône du 31.3 au 5.4 (Wid), 1 à Leuk le 14.4 (rLu) et 7 le 5.5 (aLu), et 1 le 4.5 à Saxon (rA); enfin, 2 attardés le 3.6 à Martigny (beP). Très bon passage. — **Bécassine sourde, Zwergschnepfe**: deux observations à Martigny, les 3-4.3 et le 5.5 (beP, jeF; hDu). — **Bécassine des marais, Bekassine**: trois observations seulement, la dernière, tardive, le 5.5 à Saillon (beP). — **Courlis corlieu, Regenbrachvogel**: 1 ind. séjourne du 15 au 17.4 à Martigny (beP, eRe), dans le même champ que les années précédentes. — **Courlis cendré, Grosser Brachvogel**: 1 migrateur en vol aval le 27.3 à Martigny (beP). — **Chevalier gambette, Rotschenkel**: 5 observations, à Martigny les 23-24.4 et 10.6 (beP), à Leuk le 14.4, à Grône le 25.4 (Rey) et à Baltschieder le 1.5 (Ker). — **Chevalier aboyeur, Grünschenkel**: 1 oiseau exceptionnellement hâtif le 8.3 à Grône (Rey), puis des isolés à Grône les 25.4 et 5.5 (Rey, Wid), à Martigny les 29.4 et 1.5 (phB, jeF, cK) et à Leuk le 1.5 (Rey). — **Chevalier culblanc, Waldwasserläufer**: passage du 30.3 à Martigny (beP) au 12.5 à Leuk (M. Chapuisat). — **Chevalier sylvain, Bruchwasserläufer**: 4 observations seulement, à Leuk, Grône et Martigny, la dernière le 1.6 en ce lieu (G. Laurent). — **Chevalier guignette, Flusssuferläufer**: le passage débute le 11.4 à Finges (Rey) et se termine le 5.6 à Martigny (beP).

Mouette pygmée, Zwergmöwe: 1 imm. le 3.6 à Martigny, dans un champ avec 27 Goélands leucophées (beP), curieuse escale. — **Mouette rieuse, Lachmöwe**: 5

observations entre fin mars et mi-mai, dont 15 ind. le 25.4 à Grône (Rey). — **Goéland brun, *Heringsmöwe***: 1 imm. de 3^e année le 3.6 dans un champ à Martigny (beP). — **Goéland leucophée, *Weisskopfmöwe***: observé à Martigny uniquement: isolés les 1^{er}, 6 et 23.5 et 27 ind. le 3.6 (beP, eRe).

Guifette noire, *Trauerseeschwalbe*: migrateurs isolés le 13.5 à Evionnaz (beP) et le 2.6 à Grône (wid).

Tourterelle des bois, *Turteltaube*: première le 28.4 à Martigny et max. de 10 le 10.6 à Dorénaz (beP).

Coucou, *Kuckuck*: premier le 26.4 à Grône (iSi).

Martinet noir, *Mauersegler*: premier le 28.4 à Grône (iSi). — **Martinet à ventre blanc, *Alpensegler***: premier observé le 14.4 à Törbel (jeC) et max. d'env. 15 le 8.5 à Châteauneuf (jeF).

Martin-pêcheur, *Eisvogel*: en migration, à Martigny les 2 et 29.4 (beP; rA) et à Dorénaz le 25.4 (M. Blattner).

Guêpier, *Bienenfresser*: passage court mais très fourni, dans le Haut-Valais principalement: le 19.5, 7 à Leuk (phB) et cris à Finges (aSi), puis 6 le 22.5 à Raron (C. Balzari) et 4-2 les 25-26.5 à Niedergesteln (Sal, tWy, Zur); 5 le 20.5 à Martigny (beP).

Huppe fasciée, *Wiedehopf*: passe du 23.3 à Grône (Rey) au 17.5 à Martigny (beP); une erratique, ou migrateur automnal hâtif, le 8.7 à Betten 2'040 m (O. Hegg).

Torcol, *Wendehals*: premier le 4.4 à Martigny (beP).

Alouette calandrelle, *Kurzzehenlerche*: 2 ind. du 21 au 28.4 puis le 5.5 à Martigny (beP, eRe, jeC, hDu), migrateurs fidèles au lieu de nidification de 1989; observations homologuées par la CAVS. — **Alouette lulu, *Heidelerche***: 1 le 25.2 à Rotafen/Leuk (rLu), peut-être déjà cantonnée.

Hirondelle de rivage, *Uferschwalbe*: une centaine le 5.5 à Charrat et 5 dernières le 7.6 à Martigny (beP). — **Hirondelle de rochers, *Felsenschwalbe***: premières le 2.3 à Fully (beP) et le 4 à Sion (aLu); max. d'une centaine le 26.3 à Fully (beP). — **Hirondelle de cheminée, *Raubschwalbe***: 3 premières le 22.3 à Martigny (beP). — **Hirondelle rousseline, *Rötelschwalbe***: 1 le 4.5 à Charrat, bloquée par le vent et le froid avec plusieurs centaines d'autres hirondelles (beP, jeF), vue en fin de journée à Fully (rA); homologuée CAVS. — **Hirondelle de fenêtre, *Mehlschwalbe***: première hâtive le 22.3 à Martigny; encore 800 ind. sont bloqués par les vents le 3.6 à Fully (beP).

Pipit rousseline, *Brachpieper*: début d'un passage bien fourni en 5 localités le 10.4 à Leuk (tWy). — **Pipit des arbres, *Baumpieper***: premier le 5.4 à Martigny (beP). — **Pipit farlouse, *Wiesenpieper***: dernier le 1.5 à Leuk (Rey). — **Pipit à gorge rousse, *Rotkehlpieper***: passage remarquable de 11 ind. entre le 28.4 à Martigny (hDu) et le 20.5 à Leuk (liM) avec max. de 3 le 5.5 à Leuk (aLu). — **Pipit spioncelle, *Wasserpieper***: dernier en plaine le 20.5 à Dorénaz (beP). — **Bergeronnette printanière, *Schafstelze***: passage du 27.3 au 4.6 à Martigny et max. de 200 le 5.5 à Charrat (beP). Des m. *feldegg* sont observés le 14.4 à Raron (Sal), le 28 à Martigny (beP) et le 17.5 à Grône (iSi). La sous-espèce *flavissima* est notée quant à elle le 28.4 à Martigny (2 m.; beP) et Grône (1 m.; Rey).

Rossignol, *Sprosser*: premier le 6.4 à Martigny (eRe, beP). — **Gorgebleue, *Blaukehlchen***: des m. à miroir blanc isolés les 31.3 et 6.4 à Martigny (beP) puis 1 ind. le 9.4 à Ausserberg (Ker). — **Traquet tarier, *Braunkehlchen***: 3 premiers le 20.4 à Martigny et dernier le 1.6 à Fully (beP). — **Traquet pâte, *Schwarzkehlchen***: premier migrateur le 23.2 à Vionnaz (Str), dès le début de mars ailleurs. — **Traquet motteux, *Steinschmätzer***: passage du 24.3 à Martigny au 26.5 à Dorénaz (beP), puis quelques-uns en plaine de Leuk le 18.6 (Rey). — **Merle de**

roche, Steinrötel: premier le 5.5 à Raron (Sal). — **Merle à plastron, Ringamsel:** en escapade le 5.7 à 2'550 m sur Zermatt (Zur). — **Grive mauvis, Rotdrossel:** des cris le 3.3 à Grône (aLu), seule donnée.

Locustelle tachetée, Feldschwirl: première le 25.4 à Saillon (jeF) et dernières le 20.5 à Leuk (aLu, rLu, aSi). — **Locustelle lusciniöide, Rohrschwirl:** 1 le 30.4 à Leuk, 3^e observation valaisanne (Sal). — **Phragmite des joncs, Schilfrohrsänger:** chante les 21 et 28.4 à Martigny (beP); isolés les 1^{er} et 18.5 à Leuk (Rey; R. Muheim). — **Rousserolle verderolle, Sumpfrohrsänger:** première le 18.5 à Leuk (liM). — **Rousserolle effarvatte, Teichrohrsänger:** première le 21.4 à Martigny (beP). — **Rousserolle turdoïde, Drosselrohrsänger:** 1 migrateur chante le 20.5 à Martigny (cK, beP). — **Hypolaïs icterine, Gelbspötter:** des chanteurs en migration le 16.5 à Martigny (beP) et le 26.5 à Collombey-Muraz (Str). — **Fauvette passerinette, Bartgrasmücke:** après l'abondance de ces trois dernières années, un seul chanteur a été entendu sur les coteaux du canton, le 12.5 à Leuk (hDu, adJ; homologué CAVS). — **Fauvette babillarde, Klappergrasmücke:** premières le 20.4 à Martigny et Leuk (beP; Wid). — **Fauvette grisette, Dorngrasmücke:** première le 20.4 à Martigny (beP). — **Pouillot de Bonelli, Berglaubsänger:** premier le 25.4 à Dorénaz (M. Blattner). — **Pouillot fitis, Fitis:** premier le 23.3 à Dorénaz (jeF). — **Gobemouche gris, Grauschnäpper:** premier le 1.5 à Fully (beP). — **Gobemouche à collier, Halsbandschnäpper:** deux apparitions groupées pour un oiseau encore peu vu dans le canton: m. isolés le 28.4 à Fully (jeC, hDu, beP) et le 8.5 à Leuk (cB). — **Gobemouche noir, Trauerschnäpper:** dernier migrateur, une f. le 29.5 à Dorénaz (beP).

Mésange rémiz, Beutelmeise: faible passage débutant le 19.3 à Martigny (beP) et s'achevant le 15.4 à Leuk avec 7 ind. (tWy).

Loriot, Pirol: premier chanteur le 5.5 à Grône (iSi).

Pie-grièche écorcheur, Neuntöter: première le 27.4 à Martigny (phB) où 11 migrants sont encore comptés le 10.6 (beP). — **Pie-grièche à tête rousse, Rotkopfwürger:** deux migrants isolés, les 15.5 à Martigny et 18.5 à Collonges (beP, eRe).

Niverolle, Schneefink: 10 le 7.4 au-dessus de Zermatt à 3'300 m (P. Mollet).

Bruant ortolan, Ortolan: les premiers n'apparaissent que le 1.5 à Dorénaz (beP). — **Bruant proyer, Grauammer:** premiers chanteurs le 10.3 à Leuk (Ker, Zur); ailleurs, des migrants sont notés à Martigny les 18-19.3, 4 et 10.4 (beP, phB, eRe).

INDICES DE NIDIFICATION EN 1991

Dans l'ensemble de la Suisse, la reproduction a souffert des mauvaises conditions printanières, qui ont engendré des pontes tardives. En ce qui concerne le Valais, le manque de précisions ne permet pas de le vérifier, bien qu'il n'ait vraisemblablement pas échappé à cette règle; l'effondrement du Traquet pâtre au Coude du Rhône est probablement à mettre en relation avec les tentatives avortées d'hivernage. Comme autres faits marquants de cette saison, nous retiendrons la confirmation de la colonisation de la vallée de Conches par le Roselin, qui s'y reproduit peut-être déjà, ainsi que la nouvelle nidification du Pipit rousseline et les résultats relativement rassurants des recensements de Chevalier guignette et de Petit Gravelot.

Gesamtschweizerisch gesehen litt das Brutgeschäft unter den schlechten Witterungsbedingungen, die auch späte Eiablagen bewirkten. Für das Wallis fehlen entsprechend präzise Angaben, aber es wurde wohl kaum davon ausgenommen; der

Bestandszusammenbruch des Schwarzkehlchens am Rhoneknie ist wahrscheinlich im Zusammenhang mit den gescheiterten Überwinterungsversuchen zu sehen. Als andere herausragende Ereignisse dieser Saison sind die **Besiedlung des Goms durch den Karmingimpel** (möglicherweise schon Bruten), eine **neue Brut für den Brachpieper** und die **Bestandserhebungen an Flussuferläufer und Flussregenpfeifer** zu erwähnen, die mehr oder weniger eine Bestätigung ergaben.

Blongios, Zwergreihher: deux nidifications certaines: à Leuk, 1 ad. et 1 juv. le 25.7 (Zur) et à Montorge/Sion, avec 2 juv. (A. Cotty); 1 m. le 13.7 à Grône (Rey). —

Héron cendré, Graureihher: des ad. nuptiaux sont observés en mars-avril dans différentes régions, Collonges, Martigny et Grône notamment, ce qui laisse envisager des tentatives de nidification.

Sarcelle d'hiver, Krickente: 1 couple séjourne à Grône jusqu'au 6.6, sans autre indice de nidification (aLu, iSi); 2 ind. le 22.6 à Vionnaz (Str). — **Canard colvert, Stockente:** 1 famille le 13.8 à Conches/Morgins l'650 m (Ph. Lebrun⁶). — **Harle bièvre, Gänseäger:** des tentatives de nidification peuvent être suspectées à Massongex (1 ind. le 11.6; hMe) et entre Dorénaz et Evionnaz: 1 f. le 10.6 et 1 m. en mue le 17.8 (beP).

Milan noir, Schwarzmilan: le 4.5, au moins 45 ind. sont observés à Port-Valais (pUn); indices de nidification jusqu'à Grône. — **Autour, Habicht:** présence estivale signalée principalement dans le Haut-Valais et à Fully. — **Epervier, Sperber:** principalement observé en été dans le val de Bagnes (M. Blattner), à Grône (iSi), dans le val d'Hérens (A. Haenel; R. Hirt) et dans le Haut-Valais (S). — **Aigle royal, Steinadler:** 2 aiglons à l'envol à Champéry (R. Delseth).

Lagopède, Alpenschneehuhn: signalé à Champéry (bV), à la Valerette/Vérossaz (eRe), à Nendaz et Evolène (M. Chapuisat; jcT), au-dessus de Gampel (sSt) et à Blatten (jcT); nidification certaine au-dessus d'Oberems 2'800 m (L. Willenegger). — **Tétras-lyre, Birkhuhn:** observé à Champéry (J. Guilbert) et dans le Haut-Valais à Albinen, Turmamtal, Ferden et Zwischbergen (S).

Perdrix bartavelle, Steinhuhn: nidification possible au-dessus de Gampel 2'260 m (sSt) et certaine à Champéry 2'000 m (Cl. Guex) et au-dessus de Raron 2'140 m (Sal). — **Caille, Wachtel:** très peu de données de nicheurs, tous possibles: à Leuk (1 ch.; L. Fischer) et au-dessus d'Ausserberg 1'300 et 1'500 m (3 ch.; E. Akeret).

Rôle d'eau, Wasserralle: présence constatée en mai à Finges (aLu) et en mai-juin à Leuk (U. Kägi, hMe, Rey). — **Foulque, Blässhuhn:** le 13.8, 2 familles au lac de Morgins, 1'370 m (Ph. Lebrun⁶).

Petit Gravelot, Flussregenpfeifer: 1 ind. le 25.5 à Salgesch (P. Schneeberger) pourrait être un attardé, puis 1 ind. alarme sur le Rhône à Selkingen le 2.6 (aLu), 1 couple cantonné à Gamsen le 16.6 et 6 couples cantonnés sur le Rhône à Finges (aLu, rLu). — **Vanneau, Kiebitz:** 10 ind. à Vouvry le 7.4, 8 le 19.5 et 3 le 9.6 (liM; hMe); à Vionnaz, max. de 11 ind. le 9.6 (hMe) où 2 oiseaux alarment le 25.6 (Str).

Bécasse des bois, Waldschnepfe: une seule aire de croule signalée, le 19.5 à Finges (aLu, rLu, aSi). — **Chevalier guignette, Flussuferläufer:** une très bonne année, à mettre en relation avec l'effort de recherche de la part des ornithologues. Au bord du Rhône, d'aval en amont, 14 à 17 sites potentiels se dégagent: le 29.5 un couple parade à Martigny, sans suite (beP); à Finges, 10 secteurs ont été répertoriés (aLu, rLu); à Leuk, un couple parade le 19.5 (phB, gaD, beP), puis 1 ind. le 25.5 à Baltschieder (Zur); toujours au bord du Rhône, dans la vallée de Conches, ind. isolés le 2.6 à Glurigen et Selkingen (aLu), le 30.6 à Reckingen et le 5.7 à Ulrichen (Wid; beP). Seul site non lié au Rhône, celui de Gamsen où 2-3 jeunes non volant sont observés le 16.6 (aLu, rLu).

- Tourterelle turque, *Türkentaube*:** toujours observée en été à Zermatt: 10 ind. le 18.6 (jSⁿ). — **Tourterelle des bois, *Turteltaube*:** très peu d'indices de nidification: des chanteurs isolés à Collombey-Muraz le 29.6 (hMe), à Dorénaz le 10.6 (beP) et à Salgesch le 25.5 (peS).
- Chouette effraie, *Schleiereule*:** une seule nidification certaine à Martigny a échoué: 5 jeunes trouvés morts dans un nichoir le 10.8 suite à la disparition probable d'un des adultes (beP).
- Hibou petit-duc, *Zwergohreule*:** 1 ch. le 19.5 à Arbaz (liM) et 5 nidifications probables entre Grimisuat et Ayent (aLu). — **Hibou grand-duc, *Uhu*:** en Valais central, un site avec nidification probable et un autre avec 2 juv. le 20.7 (aLu). — **Hibou moyen-duc, *Waldohreule*:** nidification certaine à Saillon (beP) et Sion (aLu). — **Chouette de Tengmalm, *Rauhfußkauz*:** 1 ch. le 16.4 sur Monthey 1'300 m (hMe).
- Engoulevent, *Nachtschwalbe*:** 3 ch. à Fully (beP); 1 ch. les 25.5 et 6.6 à Finges (peS, sSt), 2 ind. le 4.8 à Feschel (T. Matejcek) et 1 le 29.8 à Leuk (jcT).
- Martinet à ventre blanc, *Alpensegler*:** à part 1 ind. le 22.6 à Champéry (hMe), toutes les observations proviennent du Haut-Valais.
- Huppe, *Wiedehopf*:** 14 sites occupés entre Fully et Saillon (jeF) et 1 ind. le 26.5 à Saint-Léonard (beP) sont les seuls présences pour le Valais romand; les indices pour le haut du canton, tous probables, concernent 8 à 10 sites sur les communes de Salgesch, Leuk, Guttet, Feschel et Ausserberg.
- Torcol, *Wendehals*:** 1 ch. à Collonges le 27.5 (beP) est l'indice de présence le plus en aval dans la plaine du Rhône; en amont, l'espèce semble stable de Vernayaz à Saillon, en plaine et sur le coteau (jeF, beP). Dans le Haut-Valais, l'espèce est abondamment signalée en plaine et sur les coteaux, la mention la plus haute concernant une nidification probable à Blatten 1'600 m (Wid). — **Pic épeichette, *Kleinspecht*:** toujours présent dans les sites habituels à Dorénaz, Fully, Saillon et Grône (beP, jeF, iSi); les autres données proviennent de Collonges, Hérémence 1'040 m, Raron, Ausserberg et Visp (beP; Wid; Zur; tWy, ...).
- Alouette lulu, *Heidelerche*:** 1 ch. le 24.2 à Salgesch (Rey), puis le 10.3, un couple est présent à Miège, site le plus en aval (aLu); les autres données proviennent toutes du Haut-Valais, entre Leuk et Visperterminen 1'500 m (Ker, ...). — **Alouette des champs, *Feldlerche*:** deux données de haute altitude avec 4 ch. le 30.6 sur Mauvoisin/Bagnes 2'540 m (pUn) et 1 ch. le 16.7 dans le Turtmanntal à 2'400 m (rLu).
- Hirondelle de rochers, *Felsenschwalbe*:** quelques données aux environs de 2'000 m: nidification certaine à Zermatt (Zur) et au barrage d'Emosson (eRe) et nidifications possibles ou probables à Champéry, Bagnes, Fully et Conthey (P. Bosshart; pUn; jeC; jcT).
- Pipit rousseline, *Brachpieper*:** une nidification possible et une certaine à près de Guttet (Sal; peS). — **Bergeronnette printanière, *Schafstelze*:** nidifications certaines à Vouvy (2 couples; ES) et Leuk (3-4 c.; Zur, beP).
- Cincle, *Wasseramsel*:** quelques rares observations de plaine laissent supposer des nidifications possibles: le 22.4, 1 ind. à Visp (Zur) et le 20.5 1 ind. à Leuk (U. Kägi, Sch).
- Accenteur alpin, *Alpenbraunelle*:** parmi les indices de nidification les plus élevés, citons un nourrissage le 10.7 sur Unterbäch 2'860 m (Sal), des nidifications probables sur Evolène 2'900 m et Hérémence 2'860 m (jcT) et 1 ind. le 12.7 sur Zermatt 3'000 m (Zur).
- Rossignol, *Sprosser*:** pour cette saison, le «record» d'altitude revient à Ausserberg, avec des ch. à fin mai à 920 et 960 m (Sal; F. Sigg). — **Rougequeue à front blanc,**

Gartenrötel: 8 ch. à Fully et 2 à Martigny (beP). — **Traquet tarier, Braunkehlchen:** en plaine, le Tarier est toujours bien répandu dans le Haut-Valais; dans le reste du canton, des nidifications probables à Dorénaz et Martigny et une certaine à Martigny (beP). Des indices de nidification à plus de 2'000 m sont signalés au-dessus de Gampel (sSt), sur Zermatt avec 4 couples (Zur), sur Törbel avec 2 c. (Sal) et au-dessus d'Evolène avec 3 c., le plus élevé à 2'100 m (jcT). — **Traquet pâtre, Schwarzkehlchen:** le déclin des nicheurs se poursuit en aval de Sierre: nidification certaine à Collombey-Muraz (ES), probable à Dorénaz mais aucune à Martigny (beP), 2 nidifications probables à Ardon (gaD), 1 certaine à Sion (Wid) et 1 possible à Réchy (Wid). Dans le Haut-Valais, nidifications les plus élevées à Niedergesteln 1'020 m (Zur, tWy) et sur Ferden/Lötschental à 1'810 m (sSt). — **Traquet motteux, Steinschmätzer:** indices les plus élevés: nidification certaine sur Hérémence 2'800 m (jcT) et probable sur Zermatt 2'900 m (Zur). — **Merle de roche, Steinrötel:** hors Haut-Valais où l'espèce est répandue, des données de nicheurs ne proviennent que de Saint-Gingolph 1'840 m (pUn), Fully 2'070 et 2'100 m (jeC, beP) et Mauvoisin/Bagnes 2'560 m (pUn).

Bouscarle, Seidensänger: 1 ch. le 6.7 à Leuk (hDu), 2^e observation valaisanne et homologuée par la CAVS. — **Rousserolle turdoïde, Drosselrohrsänger:** une nidification probable à Leuk (div. obs.) et 1 ind. discret le 5.7 à Raron (Wid, beP). Aucun ch. à Grône (aLu). — **Hypolaïs polyglotte, Orpheusspötter:** des ch. signalés au Bouveret (pUn), à Vionnaz (ES), Dorénaz, Martigny, Fully (beP), Saillon (jeF), Grône (famille le 28.8), Salgesch (Rey), Leuk (div. obs.), Guttet (peS) et Raron (Sal). — **Fauvette orphée, Orpheusgrasmücke:** 1 ch. le 20.5 à Rotafen (cHa), le 9.6 à Visperterminen 1'480 m (Sal) et le 30.6 à Täsch (cB, jS⁶). — **Fauvette épervière, Sperbergrasmücke:** le 19.5, des ch. isolés à Brentjong/Leuk (aSi⁶) et à Erschmatt 1'400 m (P. Fitze). — **Fauvette babillarde, Klappergrasmücke:** une fois encore, la région de Zermatt se distingue par des records d'altitude: ch. isolés le 2.7 à 2'120 m et 2'240 m (Zur). — **Fauvette grisette, Dorngrasmücke:** de plus en plus rare et uniquement dans le Haut-Valais: 1 ch. le 26.5 à Brentjong, 1 c. en mai à Leuk (beP) et 1 ch. le 20.5 à Ausserberg (Ker). — **Pouillot fitis, Fitis:** 1 ch. le 9.6 à Fully 550 m (beP).

Gobemouche noir, Trauerschnäpper: 2 ch. le 13.6 dans les châtaigniers à Fully (beP).

Tichodrome, Mauerläufer: 1 ind. le 30.6 et le 6.7 à Vernayaz 500 m (jeF).

Loriot, Pirol: toujours bien répandu au bord du Rhône dans le Chablais et dans le Haut-Valais; entre ces deux pôles, 1 ch. le 1.6 à Collonges, 2 le 9.6 à Fully (beP) et 1 le 13 à Sierre (Rey).

Pie-grièche écorcheur, Neuntöter: en plaine bas-valaisanne, deux nidifications certaines à Vionnaz (Str, ES), 1 territoire à Collonges, 2 à Dorénaz, 15 à Martigny et 4 à Fully (beP), une nidification certaine à Sion et une probable à Bramois et Grône (aLu); sur le plateau de Vérossaz, plus de 20 c. ont été recensés sur 170 ha (jeF). — **Pie-grièche à tête rousse, Rotkopfwürger:** nidification possible à Grimsuat (aSi, beP) et certaine à Arbaz (hDu).

Crave, Alpenkrähe: des paires sont signalées le 14.4 au Petit Col Ferret (jeF), le 24.4 à Fionnay (M. Blattner), le 30.6 à Mauvoisin (pUn) et en juillet-août dans 4 points de la région de Zermatt (Zur, Gun). — **Choucas, Dohle:** 2 ind. le 25.5 à Baltschieder (Zur) et 4 le 30.5 à Saint-Maurice (hMe) sont les seuls indices.

Niverolle, Schneefink: en période de nidification, des données proviennent de Champéry (bV), Evolène (jcT), Réchy (rLu), Albinen (L. Fischer), Zermatt (Gun, Zur), Blatten (jcT) et Ulrichen (bV). C'est à nouveau dans la région de Zermatt que l'on mentionne les altitudes les plus élevées: 3 familles à 2'790, 3'220 et 3'820 m (Gun).

Sizerin, Birkenzeisig: deux observations de plaine en période de nidification: 1 le 2.7 à Fully (beP) et 1 ch. le 24.7 à Leuk (W. Christen). — **Roselin, Karmingimpel:** l'espèce semble s'installer dans la vallée de Conches et doit probablement y nicher: 1 c., avec m. ad., et 1 m. imm. le 5.7 à Ulrichen (Wid, beP), homologués CAVS. — **Grosbec, Kernbeisser:** signalé à Orsières (beP), Grône (iSi), Leuk (S. Birrer, R. & M. Furler) et Visperterminen (P. Baechler, Leu).

Bruant jaune, Goldammer: en plaine, 2 ch. au bord du Rhône entre Vernayaz et Dorénaz (jeF). — **Bruant zizi, Z aunammer:** en plaine, 3 territoires à Evionnaz et 1 à Dorénaz (beP); les autres observations documentent abondamment les coteaux hauts-valaisans. — **Bruant fou, Zippammer:** Zermatt se distingue à nouveau: le 22.8, alarme à 2'230 m et famille à 2'330 m (Gun). — **Bruant ortolan, Ortolan:** 1 c. le 30.6 à Collombey-Muraz (hMe), seule mention en dehors du Haut-Valais. — **Bruant proyer, Graummer:** des ch. isolés sans lendemain, le 13.5 à Evionnaz et les 3 et 6.6 en deux sites à Martigny (beP); 10 ch. à Leuk (div. obs.) et 2 à Ausserberg (Sal).

L'AUTOMNE 1991 ET L'HIVER 1991-1992

Pour plusieurs migrateurs de début d'automne, le **passage hâtif** débute peu après la mi-juillet, auxquels il faut joindre une exceptionnelle Mésange rémiz. Marquée par une première période particulièrement chaude et sèche jusqu'à la mi-septembre, cette saison de migration se distingue par une **abondance de données de Hérons pourprés**, dont seul le Valais semble bénéficier, et par une **invasion de jeunes Labbes** dans toute la Suisse, reflété chez nous par quatre observations de montagne en septembre. La fin de l'automne se solde par un **passage à nouveau très fort de Cormorans** dans le Chablais et par quelques **observations extrêmement tardives** concernant le Traquet tarius et le Pipit à gorge rousse. L'hiver enfin a été pauvre en passereaux granivores et a tout juste pu bénéficier d'une nouvelle **petite invasion de Jaseurs**.

Für verschiedene frühe Herbstdurchzügler beginnt der Zug jeweils kurz nach Mitte Juli, dazu gesellte sich 1991 ungewohnterweise auch eine Beutelmeise. Geprägt durch eine besonders warme und trockene Periode, zeichnete sich diese Zugseason durch ein — nur im Wallis festgestelltes — ungewöhnlich starkes Auftreten von Purpurreihern aus. In der ganzen Schweiz registrierbar war hingegen ein Einflug von jungen Raubmöwen, der auch 4 Nachweise in den Walliser Bergen brachte. Am Ende des Herbstes war wiederum eine sehr grosse Zahl von Kormoranen im Chablais. Zudem gab es einige extrem späte Beobachtungen von Braunkehlchen und Rotkehlpiepern. Der Winter 1991/92 schliesslich war arm an Körnerfressern und brachte einzig und allein eine erneute kleine Invasion von Seidenschwänzen.

Grèbe castagneux, Zwergtaucher: 1 le 23.12 à Martigny et 1 hivernant à Saillon (beP). — **Grèbe huppé, Haubentaucher:** 1 migrateur le 5.8 à Grône (aLu) et 1 le 27.2 (iSi); 1 ind. le 2.1 à Granges (Rey).

Cormoran, Kormoran: 1 ind. à Grône les 11 et 12.8; comme l'automne passé, forte migration constatée à Monthey: 250 passent le 5.11 et 315, en deux groupes, le 7.11 (rV¹⁵).

Héron cendré, Graureiher: en janvier-février, isolés signalés à Leuk, Evionnaz et Saillon (beP). — **Héron pourpré, Purpurreiher:** beaucoup d'observations pour un automne: isolés à Grône les 1^{er}, 3 et 10-11.8 puis le 28 et du 7 au 14.9 (Wid; Rey; iSi), et à Martigny, des isolés tardifs le 5.10 et du 12 au 14.10 (phB; beP).

Cigogne noire, *Schwarzstorch*: 1 oiseau en vol à Martigny dans le courant du mois d'août (Morand) et 1 ind. le 19.9 passe le col de Bretolet (dBd). — **Cigogne blanche, *Weissstorch***: 1 migratrice le 18.8 à Fully (beP).

Tadorne casarca, *Rostgans*: 1 ind. le 19.1 au Bouveret (ES), la première fois dans le canton? — **Tadorne de Belon, *Brandente***: 15 migrateurs franchissent le col de Bretolet le 19.10 (P. Mosimann), apparition très insolite par le nombre et le lieu. — **Canard siffleur, *Pfeifente***: 1 j. m. les 30.10 et 7.11 à Grône (Rey) puis 1 f. le 24.11 à Martigny (beP). — **Canard chipeau, *Schnatterente***: 1 c. le 13.10 à Martigny (beP) puis hivernage probable à Grône: 1 le 7.11, 5 le 29.12, 6 le 15 et 3 le 22.1, encore observés le 20.2 (Rey; aLu, iSi); 32 le 22.1 au Bouveret (jEr). — **Sarcelle d'hiver, *Krickente***: 22 ind. passent à Martigny entre le 1.9 et le 3.11 (beP), très bon passage. — **Canard colvert, *Stockente***: 1 f. en vol le 2.1 à Sembrancher (beP). — **Canard pilet, *Spießente***: à Martigny, 1 f. les 28-29.9 et 1 c. le 12.10 (beP). — **Canard souchet, *Löffelente***: 10 le 19.1 au Bouveret (ES). — **Fuligule milouin, *Tafelente***, le 2.9 à Leuk (Rey). — **Fuligule morillon, *Reiherente***: 1 ind. le 2.8 à Grône (Wid). — **Harle bièvre, *Gänsesäger***: 1 le 29.9 à Martigny (beP), rare en automne.

Bondrée, *Wespensussard*: 1 le 2.10 au col de Balme (rLu). — **Milan royal, *Rotmilan***: 1 attardé le 2.11 à Martigny (beP). — **Gypaète, *Bartgeier***: plusieurs observations dans le Bas-Valais en août-septembre: Champéry, Monthey, Dents de Morcles et Fully. Dès novembre, les données se concentrent dans le Valais central (Ardon, Conthey) et en Entremont (G). — **Busard des roseaux, *Rohrweihe***: 1 f. ou j. franchit le col de Balme le 2.10 (rLu). — **Busard Saint-Martin, *Kornweihe***: 1 le 25.9 à Vouvry (jcT); Hivernage dans le Haut-Valais seulement: 1 le 19.1 à Raron (Sal), le 28 sous Visperterminen (M. Koller) et les 29.2-1.3 à Baltschieder (Ker, tWy), peut-être déjà un migrateur. — **Epervier, *Sperber***: à noter 1 ind. le 18.9 à la Couronne de Breona 3'150 m (jEr).

Balbuzard, *Fischadler*: à Grône, 1 ind. les 3, 9, 13 et 14.9 (Wid; jcP; iSi); des ind. isolés passent le col de Bretolet le 8.9 (bV, Y. Schmidt) et le col de Balme le 2.10 (rLu).

Faucon émerillon, *Merlin*: 1 le 6.10 à Martigny (beP) et le 24.11 à Vouvry (liM). — **Faucon hobereau, *Baumfalke***: 2 le 14.9 au col de Balme (rLu).

Gelinotte, *Haselhuhn*: le 16.9, 2 ind. sur Orsières (Ch. Widmann) et le 29.10, 1 ind. sur Ardon (gaD). — **Lagopède, *Alpenschneehuhn***: notamment 1 le 29.10 sur Ardon à 1'350 m (gaD). — **Tétras-lyre, *Birkhuhn***: 2 le 13.10 sur Dorénaz (jcC).

Perdrix bartavelle, *Steinhuhn*: 6 le 15.12 à Fionnay (liM); hivernage sur les Follatères/Fully (jeF), sur Saillon 2000 m; dans le Haut-Valais, 1 le 24.12 et 6 le 15.2 à Feschel (T. Matejcek; adJ) et 4 le 30.1 à Niedergesteln (M. Koller).

Marouette ponctuée, *Tüpfelsumpfhuhn*: à Martigny, 1 le 8.9 et 1 attardée le 3.11 (beP, jeF, eRe). — **Poule d'eau, *Teichhuhn***: très peu d'indices d'hivernage: 1 ind. le 12.1 à Martigny (beP), 3 le 15 et 6 le 22 à Grône (Rey; iSi).

Petit Gravelot, *Flussregenpfeifer*: 1 le 14.7 à Martigny (beP). — **Vanneau, *Kiebitz***: très faible passage: 3 observations à Martigny entre le 6.10 et le 23.11 (beP) et quelques-uns les 7-8 et 22.10 à Leuk (Rey).

Bécassine des marais, *Bekassine*: première hâtive le 21.7 à Martigny où le passage se poursuit jusqu'au 16.11 (beP); 2 ind. passent au col de Bretolet le 15.9 (H. Dupuich⁷). — **Bécasse, *Waldschnepfe***: 1 capture le 22.9 au col de Bretolet (P. Mosimann). — **Chevalier aboyeur, *Grünschenkel***: isolé les 29.6, 2 et 9.7 à Grône (Str⁷), surprenant à cette saison. — **Chevalier culblanc, *Waldwasserläufer***: à Martigny uniquement, entre le 2.7 et le 21.9 (beP). — **Chevalier sylvain, *Bruchwasserläufer***: 1 du 10 au 18.8 à Martigny (beP) et 1 le 11.8 sur Collombey-

- Muraz l'610 m (Str). — **Chevalier guignette, *Flussuferläufer***: passe entre le 28.7 à Sion (aLu) et le 7.9 à Martigny (beP). — **Chevalier indéterminé, *unbest. Wasserläufer***: 1 ind. d'une grande espèce franchit le col de Balme le 2.10, probablement un Aboyeur (rLu).
- Labbe indéterminé, *unbest. Raubmöwe***: des isolés de passage au col de Bretolet les 6 et 9.9 et 2 le 15 (dBd; Str). A noter également, 1 juv. chassant des criquets, le 15.9 sur un alpage au-dessus de Leukerbad 2'350 m (P. Vittoz¹⁴). Ces apparitions s'inscrivent très probablement dans le mouvement de jeunes Labbes à longue queue qui a déferlé sur une grande partie de l'Europe durant le mois de septembre.
- Mouette rieuse, *Lachmöwe***: 1 le 24.7 à Leuk (W. Christen), 56 le 23.11 à Martigny (beP) et 1 le 2.2 à Granges (Rey). — **Goéland leucopnée, *Weisskopfmöwe***: 1 le 20.8 à Vernayaz (jeF).
- Guifette noire, *Trauereschwalbe***: 1 le 3.9 à Grône (Wid).
- Pigeon colombin, *Hohltaube***: 3 isolés à Martigny, le dernier le 14.10 (beP). — **Tourterelle des bois, *Turteltaube***: dernière le 29.9 à Martigny (beP).
- Hibou moyen-duc, *Waldohreule***: 5 ind. au dortoir des Follatères/Fully le 7.12 (beP).
- Martinet noir, *Mauersegler***: dernier le 24.9 au col de Bretolet (dBd).
- Martin-pêcheur, *Eisvogel***: le 2.1, 1 ind. à Grône et Granges (Rey), puis au moins 1 le 12.1 à Eggerberg (Ker) et 1 ind. le 19.1 à Saillon (beP).
- Huppe, *Wiedehopf***: le 4.8 à Fully et Feschel (beP; T. Matejcek), seules observations.
- Alouette calandrelle, *Kurzzeilenlerche***: 1 le 14.10 à Martigny (beP), homologuée CAVS.
- Hirondelle de cheminée, *Raubschwalbe***: 2 dernières le 9.11 à Martigny (jeF, beP). — **Hirondelle de fenêtre, *Mehlschwalbe***: 1 très attardée le 17.11 au Bouveret (G. Gilliéron⁷).
- Pipit rousseline, *Brachpieper***: 1 le 14.9 à Martigny (beP). — Dernier **Pipit des arbres, *Baumpieper***, le 12.10 à Martigny (beP). — **Pipit à gorge rousse, *Rotkehlpieper***: 3 attardés exceptionnels le 23.11 à Martigny (beP). — **Bergeronnette printanière, *Schafstelze***: encore 1 attardée le 10.11 à Martigny (beP). — **Bergeronnette des ruisseaux, *Bergstelze***: 1 ind. au Niggeling/Turtmanntal le 18.7 à 2'200 m; dispersion automnale? (rLu). — **Bergeronnette grise, *Bachstelze***: 2 le 12.1 à Fully (beP), seule donnée hivernale.
- Jaseur, *Seidenschwanz***: 5 ind. le 15.3 à Monthey (paB, beP, eRe) ont séjourné jusqu'au 22.3 à Bex VD; c'est la seule apparition romande de la mini-invasion qui a principalement touché le nord de la Suisse à début mars.
- Rougequeue noir, *Hausrötel***: 2 le 31.12 à Fully (beP) et le 28.1 à Ollon/Chermignon (Rey). — **Traquet tarier, *Braunkehlchen***: à nouveau des attardés à Martigny: 3 le 3.11 puis 1 ind. jusqu'au 23.11 (beP). — **Traquet pâtre, *Schwarzkehlchen***: premier migrateur le 4.8 à Martigny (beP). — **Traquet motteux, *Steinschmätzer***: dernier le 26.10 à Martigny (beP). — **Grive musicienne, *Singdrossel***: 1 le 30.12 à Fully (beP) et 3 le 5.1 au Bouveret (rhT⁷). — **Grive mauvis, *Rotdrossel***: une seule donnée, le 10.11 à Martigny (beP).
- Phragmite des joncs, *Schilfrohrsänger***: 1 ind. les 4 et 11.8 à Martigny (beP). — **Rousserolle effarvatte, *Teichrohrsänger***: 2 dernières du 12 au 14.10 à Martigny (beP). — **Hypolaïs icterine, *Gelbspötter***: 1 j. le 4.8 à Martigny (beP). — **Pouillot siffleur, *Waldlaubsänger***: premier migrateur le 21.7 à Martigny (beP). — **Pouillot véloce, *Zilpzalp***: dernier le 25.11 à Martigny (jeF); 1 ch. le 26.1 à Baltschieder (Ker) a probablement passé l'hiver. — **Pouillot fitis, *Fitis***: premier migrateur le 21.7 à Martigny (beP). — **Roitelet triple-bandeau, *Sommegolhänchen***: une troupe le 25.11 aux Follatères/Fully (jeF), l'une des rares données hivernales en Valais.

Tichodrome, Mauerläufer: hiverne à Ardon 560 m (gaD).

Mésange rémiz, Beutelmeise: petit passage à Martigny, amorcé avec un ind. hâtif le 28.7, puis du 13 au 20.10 (beP); 6 le 20.10 à Leuk (Rey).

Loriot, Pirol: deux observations en août, le 14 à Sion (aLu) et le 19 à Fully (eRe).

Pie-grièche écorcheur, Neuntöter: 2 dernières le 5.10 à Martigny (beP). — **Pie-grièche à tête rousse, Rotkopfwürger:** juv. isolés les 11 et 24.8 à Martigny (beP, eRe).

Crave, Alpenkrähe: notamment, quelques apparitions hivernales au-dessus d'Ardon 1'300 m (gaD) et 2 ind. le 12.1 à Orsières (pUn).

Etourneau, Star: 25 le 12.1 à Fully (beP) et et quelques-uns le 24.1 à Granges (Rey).

Pinson du Nord, Bergfink: une seule observation en janvier, le 2.1 à Icogne (iSi). —

Chardonneret, Distelfink: 1 les 4.12 et 1.1 à Veyras (Rey). — **Linotte, Hänfling:**

15 le 12.1 à Dorénaz (beP, eRe); observée le 20.2 à Grône (iSi). — **Sizerin,**

Birkenzeisig: 20 à 50 de janvier à mars entre Visp et Raron (Zur); vu à Grône le 8.2

(Rey). — **Roselin, Karmingimpel:** 1 j. capturé le 16.8 au col de Bretolet (Ch.

Berger), homologué CAVS. — **Bouvreuil, Gimpel:** en plaine, le 20.2 à Grône (iSi).

— **Grosbec, Kernbeisser:** hivernage complet signalé à Icogne (iSi); ailleurs, 1 le

6.1 à Sierre (Rey).

Bruant zizi, Zaunammer: une douzaine le 3.1 à Brentjong/Leuk (gCa, beP). —

Bruant fou, Zippammer: hivernage à Fully (beP) et Saint-Léonard (Rey). —

Bruant ortolan, Ortolan: 1 le 27.9 à Martigny (liM, adJ).

LE PRINTEMPS ET L'ETE 1992

Un printemps sans excès météorologiques apporte en mars-avril une **nouvelle vague de Harles bièvres** dans la région du Coude du Rhône dans des dimensions spectaculaires. Au niveau suisse, on note une très bonne fréquence de hérons méditerranéens qui ne s'est pas concrétisée en Valais; de même pour le Busard cendré. L'abondance de hannetons en mai a retenu **plusieurs Faucons kobez** après le milieu du mois, dans des proportions toutefois plus modérées qu'en 1989. Enfin, au chapitre des tendances générales, notons encore que le **passage des limicoles** fut comme ailleurs **peu étoffé**, mais en contrepartie **bien diversifié** avec l'apparition d'une Barge à queue noire et d'un Chevalier arlequin; la **Gorgebleue** quant à elle a beaucoup surpris par l'étendue et la fréquence de son passage. Enfin, l'été fut marqué, comme l'an passé, par la **présence de Circaètes** en deux points principaux du canton.

Ein Frühjahr 1992 ohne meteorologische Besonderheiten brachte im März/April eine neue Gänseäger-Welle spektakulären Ausmasses ins Gebiet des Rhoneknies. In der Schweiz wurde ein sehr guter Einflug von Reihern aus dem Mittelmeerraum registriert, was sich für das Wallis allerdings nicht bestätigte; desgleichen bei der Wiesenweihe. Das Maikäfer-Flugjahr bewog Rotfussfalken in weit grösserem Umfang als 1989, über Mitte Mai hinaus zu verweilen. Daneben ist als genereller Trend der wenig spektakuläre Limikolendurchzug zu erwähnen, der aber u.a. mit Uferschnepfe und Dunkelwasserläufer immerhin ein gutes Artenspektrum brachte; das Blaukehlchen hingegen überraschte mit seinem langewährenden und guten Durchzug. Im Sommer waren wiederum an zwei Orten Schlangennadler anwesend, was die vielen Beobachtungen vom Vorjahr noch unterstrich.

Grèbe huppé, Haubentaucher: isolés à Evionnaz le 28.3 et à Martigny du 28.3 au 2.4 (beP); à Granges, 1 le 25.3 et le 13.4 et 2 les 3 et 15.4 (Rey; aLu).

Cormoran, Kormoran: passage amorcé le 22.3 à Collonges (phB), remarqué à Collobey, Evionnaz, Martigny, Fully, Grône et Leuk. Dernier, le 8.5 à Grône (Rey).

Butor, Rohrdommel: 1 migrateur en escale curieuse le 7.3 à Miège l'225 m (R.-P. Bille²). — **Blongios, Zwergreiher:** migrateurs isolés à Martigny les 28.5 et 6.6 (beP, paB, gaD, jeF). — **Bihoreau, Nachtreiher:** passage moyen entre le 3.4 à Grône et le 26.5 à Leuk avec max. de 4 le 6.5 à Grône (Rey, ...) puis 1 erratique le 28.6 à Leuk (Sch). — **Crabier, Rallenreiher:** 1 ind. le 6.6 à Martigny (beP, jeF, gaD, paB). — **Aigrette garzette, Seidenreiher:** peu fréquente également: 2 le 14.5 à Evionnaz puis 1 en vol le 22 à Sion (beP) et 1 le 31.5 à Leuk (adJ, liM, beP). — **Héron cendré, Graureiher:** entre autres, 8 le 29.3 à Leuk (tWy). — **Héron pourpré, Purpurreiher:** passage du 19.4 au 12.6 à Martigny avec max. de 3 le 31.5 (beP); ailleurs, 1 ind. le 3.5 à Saillon (jeF) et, à Leuk, 1 le 23.4 puis 1-2 les 27 et 29.5 (Rey; jcT; beP, eRe).

Canard siffleur, Pfeifente: 1 m. le 3.4 et 1 f. du 6 au 13.4 à Grône (Rey, iSi, aLu). — **Canard chipeau, Schnatterente:** observé à Grône uniquement, les 24.3, 8 et 11.4 (Wid, iSi, Rey); hivernant attardé ou migrateur? — **Sarcelle d'hiver, Krickente:** passage faible, du 26.2 au 3.5 à Grône (aLu, Rey, iSi) avec max. de 5 ind. le 5.4 à Martigny (jeF). — **Canard pilet, Spiessente:** 3 observations à Martigny entre le 23.3 et le 20.4 (phB, beP, eRe) puis données en série provenant de Grône, avec le séjour de 1-2 ind. du 25.3 au 29.4 (aLu, iSi, Rey, Wid, ...). — **Sarcelle d'été, Knäkente:** le passage débute le 14.3 à Martigny (beP) et s'achève le 18.4 à Ausserberg (Ker); hors de ces deux localités, la majorité des données proviennent de Grône (iSi, Wid, ...) puis 4 ind. le 21.3 à Vouvry (hMe), 3 les 21.3 et 8.4 à Leuk (Wid, Zur) et 1 le 7.4 à Charrat (beP). — **Canard souchet, Löffelente:** à Grône, 2 le 6.3 puis 1 le 1.4 et le 22.4 (Rey; beP); à Martigny, 2 le 28.3 et 1 le 18.4 puis et 4 le 13 à Granges (aLu); enfin, 12 le 23.4 à Leuk (Rey). — **Nette rousse, Kolbenente:** 2 le 7.5 au Bouvet (hMe). — Bon passage du **Fuligule milouin, Tafelente:** premier le 22.2 à Evionnaz, suivi de 5 le 15.3 à Collombey (beP), puis 4 données de Grône: isolés les 16 et 25.3 et 1^{er} et 5.4 (iSi, aLu, ...). — **Fuligule morillon, Reiherente:** 2 le 16.3 à Grône (iSi, Rey) puis 3 le 28.3 à Lens l'140 m (iSi) et 1 attardé le 20.5 à Leuk (liM). — **Harle bièvre, Gänsesäger:** passage à nouveau très abondant dans la région du Coude du Rhône et jusqu'à Saint-Maurice: entre le 9.3 et le 25.4, env. 40 ind. différents ont été observés avec max. de 16 le 6.4 (cK, jeF, beP). Autre observation: 2 le 10.4 à Vionnaz (hMe).

Bondrée, Wespenbussard: première le 10.5 à Fully (beP). — **Milan noir, Schwarzmilan:** premier le 4.3 à Port-Valais (hMe). — **Milan royal, Rotmilan:** 3 observations d'avril, le 7 à Grône (paO), le 20 à Collonges (beP) et le 25 à Fully (jeF) puis deux attardés en mai, le 2 à Martigny et le 15 à Fully (beP). — **Gypaète, Bartgeier:** Balthazar, lâché en 1988, séjourne dans le val de Bagnes du 9.3 au 9.4 et est suivi par République du 23.4 au 6.5 (V. May, Ph. Maret, ... G); de son côté, Avrell est observé le 2.6 au val d'Arpette/Orsières (G. Ropraz G) et Robin (?) le 16.6 au col de Cou/Champéry (M. Chesaux G). — **Circaète, Schlangenadler:** à nouveau beaucoup d'observations cette année, concernant 3 ind. dans la région de Fully-Saillon (10.5-2.8; rA, beP, ...) et 2 ind. sur le coteau de Leuk-Gampel (12.6-23.7; rA, gCa, jeC), ce qui porte à 5 au moins le nombre de Circaètes ayant estivé en Valais! Ailleurs, deux données concernent probablement les mêmes oiseaux en balade: le 26.6 à Chamoson (paO) et le 2.7 à Mund (M. Kéry). — **Busard des roseaux, Rohrweihe:** passage étendu (2.4-7.6) et relativement important, remarqué à Martigny, Fully, Grône et Leuk, et culminant entre le 7 et le 19.4 (beP; aLu; gaD, ...). — **Busard Saint-Martin, Kornweihe:** toutes les données proviennent du Haut-Valais: le 15.3 à Visp, le 8.4 à Leuk, le 17 à Lalden et le 18 à Ausserberg (tWy; Wid; Ker). — **Busard cendré, Wiesenweihe:** une seule observation, le 3.5 à Finges (aLu, rLu, aSi). — **Buse, Mäusebussard:** une escapade à très haute altitude:

- 1 ind. prend une ascendance jusque vers 4'000 m le 3.8 dans le vallon de Réchy (rLu). — **Aigle royal, Steinadler**: 1 ind. attaque 25 Lagopèdes le 19.8 dans le vallon de Lona (rLu).
- Balbuzard, Fischadler**: fidèle aux marais de Grône, l'espèce est à nouveau observée en avril, du 12 au 23 (rA, aLu, rLu, iSi) puis le 11.5 (Rey).
- Faucon kobez, Rotfussfalke**: plusieurs observations, dans l'ensemble tardives, entre le 16.5 et le 12.6 à Leuk (liM, rA, ...) avec max. de 10 le 22.5 (adJ, beP). Ailleurs, signalé à Dorénaz, le 23.5 (eRe) et les 5-6.6 (beP) et 2 f. le 30.5 à Münster (Rey). — **Faucon émerillon, Merlin**: des migrateurs les 9 et 21.3 à Martigny (beP; pHB), le 3.4 à Vionnaz (paB, eRe, beP) et un attardé le 11.5 à Leuk (liM). — **Faucon hobereau, Baumfalke**: très tardif lui aussi: 1 le 27.5 à Leuk (jcT) et le 31.5 à Martigny (liM, beP).
- Perdrix bartavelle, Steinhuhn**: le 18.3, 1 à Zeneggen (Zur) et le 25.4, 2 sur Vouvry 1'500 m (jcT).
- Rôle des genêts, Wachtelkönig**: le 14.4 à Martigny, 2 rémiges en bon état sont découvertes dans un nid de Moineau friquet (pHB, beP¹)! — **Foulque, Blässhuhn**: 66 ind. le 25.3 à Grône (aLu).
- Grue, Kranisch**: 12 ind. en migration le 8.4 sur Vernayaz (A. Berthoud), phénomène rare et nombre important pour le canton.
- Oedicnème, Triel**: une nouvelle observation à Martigny, dans le même champ qu'en 1991: 1 le 30.5 (beP, hDu).
- Petit Gravelot, Flussregenpfeifer**: passage très faible: isolés les 23 et 31.3 à Grône (Rey; Wid), 3 le 7.4 à Finges (Rey), puis isolés le 19.4 à Getwing/Leuk (Rey) et le 25.4 à Martigny (beP). — **Vanneau, Kiebitz**: passage très moyen, remarqué principalement à Vouvry-Vionnaz (max. 28 le 29.2) et à Martigny (max. 24 le 9.3; beP); 1 le 10.3 à Grône, puis à Leuk, 2 le 30.3 (Rey) et 1 attardé ou erratique le 3.5 (aLu).
- Combattant, Kampfläufer**: à Vouvry, 1-2 les 29.3 et 3.4 (paB, beP, eRe), puis à Fully le 1.4 (beP), à Grône les 31.3, 14 et 15.4 (Wid; rLu; aLu) et à Leuk, 2 le 17.5 (liM). — **Bécassine des marais, Bekassine**: faible passage entre le 8.3 et le 3.4 à Martigny (5 ind.; beP); 1 le 4.4 à Leuk (rLu). — **Barge à queue noire, Uferschnepfe**: 1 le 31.3 à Grône (Wid), 6^e observation valaisanne. — **Chevalier arlequin, Dunkler Wasserläufer**: 1 du 9 au 12.4 à Grône (aLu, Rey, Wid). — **Chevalier gambette, Rotschenkel**: des cris nocturnes le 23.5 au-dessus de Sion (aLu). — **Chevalier aboyeur, Grünschenkel**: à Grône, 1 ind. séjourne du 6 au 15.4 (aLu, rLu, iSi). — **Chevalier culblanc, Waldwasserläufer**: à Martigny, passe du 27.3 au 26.4 avec max. de 6 le 3.4 (beP); ailleurs, 1 le 31.3 à Saint-Pierre-de-Clages (rA), les 14.4, 24.4 et 18.5 à Leuk (Rey) et le 16.4 à Sion (aLu). — **Chevalier sylvain, Bruchwasserläufer**: passage très discret: 2 le 17.5 à Leuk (liM) et 1 le 22.5 à Turtmann (beP). — **Chevalier guignette, Flusserläufer**: également peu vu en migration: premier hâtif le 10.3 à Grône (Rey), puis 1 le 14.4 à Ausserberg (Ker), le 2.5 à Collonges et le 30 à Martigny (beP); trois données de Finges en mai concernant probablement des nicheurs.
- Mouette rieuse, Lachmöwe**: deux grands groupes observés, une 40^e en vol aval le 11.3 à Evionnaz (jeF) et une 100^e le 10.5 à Grône (Rey). — **Goéland leucophée, Weisskopfmöwe**: 1 le 6.4 à Martigny (beP); 1 subadulte le 31.5 en vol à Sion (aLu).
- Sterne arctique, Küstenseeschwalbe**: le 2.5, 1 ind. près de l'embouchure du Rhône au Bouveret (pUn, homologué CAVS¹⁰), première donnée sur «terres» valaisannes; 2 oiseaux ont séjourné les 2-3.5 dans le périmètre des Grangettes VD.
- Pigeon colombin, Hohltaube**: premier le 29.2 à Dorénaz (beP); 1 le 16.3 à Grône (iSi). — **Pigeon ramier, Ringeltaube**: le mauvais temps a formé quelques rassemblements importants: 450 le 15.3 à Vouvry (paB, beP, eRe) et 150 le 3.4 à Dorénaz (beP).

Martinet noir, Mauersegler: premier le 14.4 à Grône (rA).

Guêpier, Bienenfresser: 1 ind. suit le cours du Rhône le 12.6 à Raron (rA).

Huppe, Wiedehopf: première le 5.4 à Martigny (beP).

Torcol, Wendehals: premier le 2.4 à Grône (Wid).

Alouette calandrelle, Kurzzehenlerche: 2 ind. le 9.5 à Martigny, dont 1 ch. un sourdine, sans suite (beP); homologués CAVS. — **Alouette lulu, Heidelerche**: première de retour le 15.2 à Rotafen (adJ) puis 1 le 3.3 à Leuk (Zur).

Hirondelle de rivage, Uferschwalbe: max. d'une centaine le 2.5 à Fully; dernière le 8.6 (beP). — **Hirondelle de rochers, Felsenschwalbe**: 2 premières le 24.2 à Leuk (Rey). — **Hirondelle rousseline, Rötelschwalbe**: 1 les 2-3.5 à Fully (beP, hDu; homologuée CAVS), 3^e observation valaisanne. A noter la concordance de lieu et de date avec l'observation de l'année dernière. — **Hirondelle de fenêtre, Mehlschwalbe**: 2 premières le 6.4 à Martigny (beP). — **Hirondelle de cheminée, Raubschwalbe**: première le 28.3 à Martigny (beP).

Pipit rousseline, Brachpieper: passage très court, remarqué à Martigny uniquement: 1 les 16 et 18.4, puis 6 le 24 et 2 le 26 (beP). — **Pipit à gorge rousse, Rotkehlpieper**: 1 hâtif le 8.4 à Leuk (Wid). — **Bergeronnette printanière, Schafstelze**: première le 1.4 à Riddes (beP).

Gorgebleue, Blaukehlchen: fréquence remarquable: 3 ind. différents à Martigny, le 22.3, du 1^{er} au 5.4 et le 19.4 (phB, beP, eRe), 1 le 5.4 à Raron (Zur) et 1 le 20.4 à Leuk (rLu, aSi, L. Cameuzind). — **Rougequeue noir, Hausrötel**: premier le 8.3 à Chamoson (aLu). — **Rougequeue à front blanc, Gartenrötel**: premier le 6.4 à Martigny (beP). — **Traquet tarier, Braunkehlchen**: premier le 9.4 à Leuk (aLu). — **Traquet pâtre, Schwarzkehlchen**: retour massif le 29.2 à Martigny (beP) et Leuk (tWy); un m. erratique le 24.5 à Martigny (beP). — **Le Traquet motteux, Steinschmätzer** passe du 28.3 au 21.5 à Martigny, où 2 ind. redescendent en plaine le 6.6 à cause des mauvaises conditions atmosphériques en altitude (beP). — **Merle à plastron, Ringamsel**: plusieurs migrateurs sont retenus en plaine par le mauvais temps: 1 le 1.4 à Collonges (beP) et une cinquantaine le 17.4 à Monthey (hMe). — **Grive draine, Misteldrossel**: en escapade le 23.7 au-dessus de Branche/val Ferret à 2'550 m (beP, eRe).

Locustelle tachetée, Feldschwirl: passage assez faible entre le 19.4 (Fully; jeF) et le 12.5 (Raron; Sal). — **Phragmite des joncs, Schilfrohrsänger**: des isolés le 3.5 à Brig-Glis (tWy) et le 24.5 à Leuk (liM). — **Rousserolle effarvatte, Teichrohrsänger**: première hâtive le 12.4 à Dorénaz (phB). — **Rousserolle turdoïde, Drosselrohrsänger**: présente déjà le 26.4 à Leuk (hDu); 1 ch. le 10.5 à Grône, sans suite (Rey). — **Hypolaïs icterine, Gelbspötter**: des migrateurs isolés le 12.5 à Vérossaz (jeF) et le 24.5 à Leuk (liM). — **Fauvette à tête noire, Mönschgrasmücke**: première le 8.3 à Chamoson (aLu). — **Pouillot siffleur, Waldlaub-sänger**: premier le 11.4 à Martigny (beP). — **Pouillot fitis, Fitis**: premier le 30.3 à Martigny (beP).

Gobemouche gris, Grauschnäpper: premier le 1.5 à Martigny (beP). — **Gobemouche noir, Trauerschnäpper**: premiers le 18.4 à Martigny (beP).

Mésange rémiz, Beutelmeise: isolées le 9.4 à Leuk (aLu), 2 le 10 à Grône (Rey) et 1 le 16 à Martigny (beP).

Loriot, Pirol: premier le 26.4 à Martigny (beP).

Pie-grièche écorcheur, Neuntöter: première le 30.4 à Fully (rA).

Crave, Alpenkrähe: 8 le 17.3 près de Fionnay (rA) et 14 le 1.4 à Leuk (liM). — **Choucas, Dohle**: retour le 29.2 à Vouvry et Dorénaz (beP) où le dernier est vu le 9.4. — **Corbeau freux, Saatkrähe**: de retour également le 29.2 à Vouvry et Dorénaz, puis 1 le 3.4 au même lieu (beP). — **Corneille mantelée, Nebelkrähe**: en altitude, 2 le 29.6 à Geschinen 1'350 m (aLu).

Pinson du Nord, Bergfink: retour tardif et remarqué: env. 500 le 28.3 à Dorénaz et 20 derniers le 1.4 (beP). — **Grosbec, Kernbeisser:** un groupe de 25 ind. le 28.3 aux Marécottes (P. Rapin⁷).

Bruant ortolan, Ortolan: premier le 26.4 à Martigny (beP). — **Bruant proyer, Graumammer:** des chanteurs sont entendus dès le 21.3 à Leuk (Sal); 1 migrateur le 16.4 à Martigny (beP).

INDICES DE NIDIFICATION EN 1992

Malgré un mois de juin très médiocre, la Station ornithologique note une bonne reproduction pour l'ensemble de l'avifaune. En Valais, nous retiendrons deux événements: la **nidification du Guêpier**, déjà suspectée à la fin des années 70, qui n'a semble-t-il pas été trop gênée par les intempéries de juin, et celle de la **Pie-grièche à tête rousse dans le Bas-Valais**. Nous noterons encore pour les bonnes nouvelles la poursuite de la **colonisation du Milan noir** dans la vallée du Rhône et celle du **Roselin dans la vallée de Conches**; plusieurs mentions attestent de la présence estivale du **Pipit rousseline** et des **bons effectifs du Bruant proyer**, également constatés à l'échelon national. Les fauvelles méditerranéennes ont peut-être passé inaperçu en cette fin de printemps mais la principale déception provient de la **régression de la Huppe** dans ses bastions de Fully-Saillon.

Trotz einem sehr mittelmässigen Juni meldete die Schweizerische Vogelwarte ein alles in allem gutes Brutjahr. Für das Wallis seien zwei Ereignisse festgehalten: Nach Brutverdacht am Ende der 70er Jahre nun die ersten Bruten von Bienenfressern, die unter dem ungünstigen Juni-Wetter offenbar kaum gelitten haben und im Unterwallis die Brut des Rotkopfwürgers. Weiter erwähnenswert ist die Ausdehnung des Brutgebiets des Schwarzmilans im Haupttal und des Karmingimpels im Goms. Brutzeitbeobachtungen gab es wieder für den Brachpieper. Auch waren wie landesweit gute Bestände bei der Graumammer zu verzeichnen. Die mediterranen Grasmücken traten vielleicht unbeobachtet auf. Die grösste Enttäuschung war der Rückgang des Wiedehopfs in seiner Bastion um Fully-Saillon.

Grèbe huppé, Haubentaucher: 10 nids le 12.7 dans le port du Bouveret (rhT NO).

Blongios, Zwergreiher: une nidification certaine à Leuk: 1 f. et 1 j. le 12.7 (paB, beP); le 2.7, 1 m. à Martigny, très probablement erratique (beP). — **Héron cendré, Graureiher:** toujours observé en mars près de Martigny (beP) et en mars-avril à Grône (iSi).

Bondrée, Wespenbussard: toutes les données concernent la rive droite du Rhône, dans le Haut-Valais principalement; 1 le 29.6 à Münster dans la vallée de Conches (beP). — **Milan noir, Schwarzmilan:** l'espèce poursuit sa progression vers l'amont: 1 ind. au moins séjourne en été à Leuk (beP). — **Autour, Habicht:** signalé notamment le 10.5 à Monthey (hMe).

Faucon crécerelle, Turmfalke: au Pas de Lona, 1 famille à 2'700 et 2'850 m (rLu; rA). — **Faucon pèlerin, Wanderfalke:** nidifications probables signalées en trois localités du Valais central (aLu, beP) et en 4 au moins du Haut-Valais (Gun, M. Kéry, tWy, Sal).

Gelinotte, Haselhuhn: signalée le 16.4 sur les Hauts de Mex (eRe). — **Lagopède, Alpenschneehuhn:** nidification probable sur Albinen (Sch) et certaine à Salanfe/Salvan (eRe); 25 ind. le 19.8 dans le vallon de Lona 2'700 m (rLu). — **Tétras-lyre, Birkhuhn:** présence estivale au col de Bretolet (S), au Cato-

- gne/Champex, dans le val Ferret à Branche (beP, eRe) et dans le Haut-Valais, sur Inden (jcT), sur Mörel et dans le Binntal (M. Güntert, Zur).
- Perdrix bartavelle, Steinhuhn:** signalée en juillet au-dessus d'Ayer 2'800 m (P. Rüegg) et de Mörel 2'080 m (Ch. Marti). — **Caille, Wachtel:** dans le Haut-Valais, 5 ch. à Leuk (div. obs.), 1 à Turtmann, 4 à Gampel (beP) et 1 à Oberwald (aLu, beP, aSi).
- Râle d'eau, Wasserralle:** 1 le 27.5 à Leuk (jcT). — **Marouette poussin, Kleines Sumpfhuhn:** 1 ch. le 8.7 à Grône (aLu), homologué CAVS.
- Petit Gravelot, Flussregenpfeifer:** 2 c. cantonnés le 3.5 à Finges et 1 ind. alarme à Gamsen le 29.6 (aLu); 1 m. le 31.5 à Leuk dans les comblements d'un marais essaie probablement de s'installer (beP). — **Vanneau, Kiebitz:** 7 m. parquent le 3.4 à Vouvry (beP, eRe, paB), où 5 oiseaux sont revus en mai (hMe), ainsi que 4 le même jour à Vionnaz (paB, beP, eRe), revus en mai également (hMe).
- Bécasse, Waldschnepfe:** le 9.5, croule au col des Planches/Martigny (beP) et Finges (rLu, aSi). — **Chevalier guignette, Flussuferläufer:** accouplement le 30.5 à Martigny mais disparition causée par la montée des eaux du Rhône (beP); 4 nidifications probables sur le Rhône à Finges (Sch).
- Pigeon colombin, Hohлтаube:** 1 ind. le 29.5 à Rotafen/Leuk (beP) laisse entrevoir une nidification possible. — A nouveau peu de données de **Tourterelle des bois, Turteltaube:** 1 ch. le 6.7 à Leuk (aLu) et 1 ind. le 22.7 (erratique?) à Martigny (beP); 2 nidifications probables à Gampel (beP).
- Chouette effraie, Schleiereule:** 1 ind. trouvé mort sur l'autoroute à Martigny en avril (rA) laisse supposer des couples inconnus dans la région.
- Hibou petit-duc, Zwergohreule:** une nidification certaine à Grimsuat avec 4 juv. en nichoir (aLu). — **Hibou grand-duc, Uhu:** 2 nidifications certaines dans le Valais central (aLu). — **Chouette chevêchette, Sperlingskauz:** 1 ch. en mars à la Combe de l'A/Liddes (rA); accouplement le 7.3 au col de la Forclaz/Trient et 1 ch. le 8.4 au-dessous de Champex 1'360 m (beP). — **Hibou moyen-duc, Waldohreule:** nidifications certaines à Collonges, Martigny et Sion (beP; aLu); une rémige primaire trouvée le 9.7 à Collombey (beP). — **Chouette de Tengmalm, Raufusskauz:** 3 ch. en-dessous de Champex à début avril (beP).
- Engoulevent, Nachtschwalbe:** 2 c. à Fully (beP); nidifications probables à Leuk, Albinen, Erschmatt, Bratsch, Raron et Visp (div. obs.).
- Martinet à ventre blanc, Alpensegler:** hors Haut-Valais, signalé en été à Icogne (iSi) et Orsières (beP).
- Guêpier, Bienenfresser:** une colonie de 5 c. a donné 23 jeunes au moins à l'envol (beP, rA, ...), première nidification prouvée en Valais.
- Huppe, Wiedehopf:** en régression entre Fully et Saillon où plusieurs sites habituels sont inoccupés (jeF); 1 ch. le 3.5 à Saint-Léonard (aLu) clos le chapitre du Valais romand. Dans le haut du canton, l'espèce paraît stable et se montre à des altitudes élevées: 1 ch. le 12.5 à Erschmatt 1'500 m (Zur) et 2 ind. le 29.7 à Zeneggen 1'400 m (U. Kägi).
- Torcol, Wendehals:** en plus de l'an dernier, 4 nidifications probables concernent la vallée de Conches, à Geschinen, Ulrichen et Obergesteln (beP). — **Pic noir, Schwarzspecht:** 2 ch. sont entendus à basse altitude: le 8.3 à Vex 700 m et le 9.4 à Grône 600 m (aLu). — **Pic épeichette, Kleinspecht:** retrouvé dans la plupart des localités signalées l'an passé, augmentées de Vernayaz, Vex, Icogne, Leuk, Turtmann, Gampel, Baltschieder et Naters. Présence également constatée dans la vallée de Conches vers 1'350 m à Münster, Geschinen et Ulrichen (beP).
- Alouette lulu, Heidelerche:** chante le 8.4 à Saint-Léonard et le 3.5 à Salgesch (aLu); 1 ch. à Miège (rA); toutes les autres données concernent des localités en amont de

Leuk. — **Alouette des champs, Feldlerche**: les traditionnels ch. d'altitude sont entendus à Eison/Hérens 2'300 m (3 le 31.5; rLu, aSi), à Loveigno/St-Martin 2'600 m (2 ch.; aLu) et sur Liddes 2'420 m (4 le 23.7; beP, eRe).

Hirondelle de rochers, Felsenschwalbe: nidifications probables à haute altitude avec une dizaine d'ind. le 21.7 au Catogne/Orsières 2'300 m (beP).

Pipit rousseline, Brachpieper: nidification possible à Leuk (Zur) et probable à Raron (Sal). — **Bergeronnette printanière, Schafstelze**: nidification possible à Collombey-Muraz (hMe) et nidifications probables à Leuk (3 c.; liM), Turtmann (2 c.), Gampel (2 c.; beP) et Raron (1 c.; Ker, Sal).

Cincle, Wasserramsel: nidifications en plaine: 1 nid à fin mars à Vouvry (ES); 1 ind. les 14 et 18.4 à Ausserberg (Ker).

Accenteur alpin, Alpenbraunelle: en période de nidification, des observations à Zwischbergen 3'150 et 3'260 m (Sal).

Rossignol, Sprosser: à nouveau des ch. à des altitudes élevées dans le Haut-Valais: à Guttet 910, 930 et 1'000 m (Zur; Sal) et Ausserberg 960 m (F. Sigg). — **Rougequeue à front blanc, Gartenrötel**: très épars en plaine de Fully-Saillon mais très bien représenté dans la vallée de Conches: 11 territoires entre Reckingen et Oberwald (beP); 1 ch. le 14.6 à Zermatt 1'650 m (aLu). — **Traquet tarier, Braunkehlchen**: 2 ch. le 13.6 à Collombey (hMe), seul indice de nidification de plaine hors Haut-Valais. Des nidifications de haute altitude: 3 territoires entre 2'020 et 2'040 m sur Leukerbad (Gun), 1 famille le 17.7 sur Zermatt 2'030 m (Zur) et 10 couples au Simplon vers 2'000 m (P. Blaser). — **Traquet pâtre, Schwarzehlchen**: toujours très peu d'indications en plaine bas-valaisanne: 1 j. trouvé mort sur la route le 9.7 à Vouvry (beP) est peut-être en dispersion et un couple le 13.6 à Collombey-Muraz (hMe); une nidification probable à Dorénaz et une certaine et deux probables à Martigny (beP); enfin, couples cantonnés en avril à Grône et Réchy (rLu, aLu). Des indices de nidification sur le haut du coteau sont à nouveau signalés dans le Haut-Valais, avec un couple près de Rotafen 940 m (hMe) et 1 ind. le 27.6 à Niedergesteln 1'000 m (F. Sigg). — **Merle de roche, Steinrötel**: seules données hors Haut-Valais: 2 territoires à Loveigno/Saint-Martin 2'200 et 2'400 m (rLu).

Rousserolle verderolle, Supmrohrsänger: dans la vallée de Conches, des nidifications probables à Reckingen 1'320 m et Münster 1'360 m (aLu, beP). — **Rousserolle turdoïde, Drosselrohrsänger**: nidification probable à Martigny dans un décanteur d'autoroute (beP) et à Leuk (div. obs.). — **Hypolaïs polyglotte, Orpheusspötter**: de «nouvelles» localités par rapport à l'année dernière: 1 ch. les 28.6 et 1.7 à Collombey-Muraz (Str) et le 8.6 Ausserberg (Ker). — **Fauvette babillarde, Klappergrasmücke**: le 31.5, 10 ch. sur 1 km de lisière à Loveigno/Saint-Martin (aLu). — **Fauvette grisette, Dorngrasmücke**: 1 ch., probablement solitaire, à Martigny (beP) est le seul du Valais romand; autres chanteurs: à Gampel (beP), Ausserberg 1'100 m (Sch), Zeneggen 1'460 m (tWy) et Reckingen 1'470 m (M. Roost). — **Pouillot siffleur, Waldlaubsänger**: en altitude, des ch. isolés sont entendus dans les mélèzes de Zinal 1'700 m le 25.6 (D. Glayre⁷) et de Münster 1'350 m le 29.6 (aLu, beP). — **Pouillot fitis, Fitis**: 1 ch. les 14-15.6 à Oberwald 1'390 m (beP).

Loriot, Pirol: aucune donnée en dehors du Chablais et du Haut-Valais.

Pie-grièche écorcheur, Neuntöter: en plaine bas-valaisanne, 1 territoire à Collombey et Massongex (hMe), 2 à Collonges et 7 à Martigny (beP). Un exemple de forte densité, dans le Haut-Valais, avec 15 territoires sur 1 km² à Visperterminen entre 1'400 et 1'460 m (U. Kägi). — **Pie-grièche à tête rousse, Rotkopfwürger**: un événement pour le Bas-Valais, où l'espèce n'est plus signalée depuis 20 ans: 1 f. nour-

rit 3 j. du 1^{er} au 3.8 à Vérossaz (jeF³); une nidification certaine à Arbaz (beP).

Crave, Alpenkrähe: 3 ind. au-dessus de Varen 2'230 m le 27.5, 2 le 7.6 sur Conthey 2'200 m (jcT), puis 3 le 14.6 au Gornergratt (aLu) et 2 le 21.6 à Leukerbad 1'950 m (Gun). — **Choucas, Dohle:** nidification certaine (3 c.?) à Saint-Maurice (hMe) et Leukerbad 1'400 m (1 famille en juillet; Gun); 10 ind. le 27.5 à Leuk (jcT).

Niverolle, Schneefink: signalée cet été à Branche dans le val Ferret (beP, eRe), à Mauvoisin/Bagnes (eRe), au-dessus de Conthey, Savièse (jcT) et Ayer (P. Rüegg) ainsi qu'au-dessus d'Inden (jcT), Albinen (Sch) et Ulrichen (M. Güntert).

Serin, Girlitz: 6 territoires ou familles en juillet à Champex 1'500 m (beP). — **Linotte, Hähnfling:** 3 ind. au-dessus de Branche/val Ferret 2'450 m le 23.7 (beP, eRe). — **Sizerin, Birkenzeisig:** en plaine, à nouveau signalé à Fully (nid le 2.8; liM) et Leuk (jeC). — **Beccroisé, Fichtenkreuzschnabel:** beaucoup signalé dès la mi-mai, dans le Haut-Valais principalement. — **Roselin, Karmingimpel:** l'espèce semble s'implanter réellement dans la vallée de Conches: un m. ad. le 9.6 à Ulrichen (U.N. Glutz⁹) puis m. imm. chanteurs le 14.6 à Reckingen, Geschinen, Ulrichen et Oberwald, retrouvés le 30.6 (beP, aLu, aSi). — **Grosbec, Kernbeisser:** en période de nidification, signalé à Vérossaz (jeF), Leuk (Sch) et Gampel (beP).

Bruant jaune, Goldammer: 1 ch. en plaine le 26.4 à Evionnaz (beP). — **Bruant zizi, Zaunammer:** dans le Bas-Valais, 1 ind. le 6.4 à Troistorrens et le 24.4 à Salvan (jcT), 1 ch. le 11.4 à Saint-Maurice (eRe), 1 ch. en plaine de Martigny le 8.4 dans un site habituel (beP) et 2 ch. à Saillon (rA). — **Bruant ortolan, Ortolan:** rien en dehors du Haut-Valais! — **Bruant des roseaux, Rohrammer:** 2 c. nichent dans les blés à Gampel (beP). — **Bruant proyer, Graumammer:** 8-9 ch. à Leuk (div. obs.), 1 à Turtmann et Gampel (beP).

L'AUTOMNE 1992 ET L'HIVER 1992-1993

Cet automne s'est distingué par **plusieurs captures d'espèces rares au col de Bretolet**, ainsi que par le **passage extraordinaire du Busard Saint-Martin** le 31 octobre. Après des mois d'octobre et de novembre très humides, l'hiver fut doux dans l'ensemble, ce qui a permis un **très bon hivernage parmi les passereaux** et quelques **observations élevées d'espèces montagnardes** au cœur de l'hiver. Celui-ci n'a pas manqué de surprises avec le premier **séjour prolongé du Fuligule nyroca** dans le canton; le **Cormoran** quant à lui continue à tenir l'affiche et hiverne maintenant à Grône-Granges avec des effectifs dépassant la dizaine d'individus.

Der Herbst brachte mehrere ungewöhnliche Fänge auf dem Col de Bretolet und am 31. Oktober einen aussergewöhnlichen Zugtag für die Kornweihe. Nach sehr feuchtem Oktober und November blieb der Winter 1992/93 insgesamt mild, was den Singvögeln eine sehr gute Überwinterung ermöglichte. So gab es auch mitten im Winter einige hohe Nachweise von Bergvögeln. Auch der Winter brachte Überraschungen, so etwa den ersten längeren Aufenthalt einer Moorente im Kanton; der Kormoran macht weiter von sich reden und überwintert nun bei Grône-Granges in mehr als 10 Ex.

Grèbe castagneux, Zwergtaucher: hivernage de 3-4 ind. à Saillon (beP) et de 12 le 31.1 à Grône (aLu). — **Grèbe huppé, Haubentaucher:** isolés à Martigny du 23 au 29.9 et les 4-5.10 (cK, beP); 1 le 6.11 à Granges (aLu). — **Grèbe à cou noir, Schwarzhalsraucher:** 1 le 12.9 au Bouveret (rhT NO).

Cormoran, Kormoran: premiers mouvements décelés le 21.9 à Bretolet (6 ind.; Y. Schmidt). Deux groupes importants: 17 le 31.10 sur Martigny (beP) et une 40^e le

6.11 remontent la vallée du Rhône à Fully (gCa), puis un passage transalpin de 2 ind. le 6.12 à la Fenêtre de Ferret (aLu, rLu, aSi). Hivernage: 1 ind. à Saint-Maurice de novembre à fin février, 2-4 dans la région de Martigny (beP) puis, à Grône, 6 ind. les 6 et 10.11, 15 le 2.12, 10 le 5.1 puis 3 le 31.1 (aLu; rLu, ...).

Blongios, Zwergreiher: encore 2 le 2.9 à Leuk (cK). — **Bihoreau, Nachtreiher:** 2 imm. le 10.8 à Leuk (rLu), seule observation. — **Héron gardeboeuf, Kuhreiher:** 1 ind. bague, probablement échappé de captivité, les 9 et 12.12 au Bouveret (paB, beP; homologué CAVS) est la première donnée pour le canton. — **Héron cendré, Graureiher:** en décembre-janvier, 1 hivernant entre Collonges et Evionnaz, et 1 à 4 à Martigny (beP); 13 ind. hivernent à Grône (aLu). — **Héron pourpré, Purpureiher:** 1 ind. le 27.8 à Vouvry (Y. Eray).

Cigogne noire, Schwarzstorch: 1 ind. le 19.9 franchit le col de Bretolet (gCa, jeF, bV, ...). — **Cigogne blanche, Weissstorch:** 1 ind. le 3.7 à Leuk (Sch) et au même endroit à la fin du mois (B. Fuhrer); 1 le 20.8 à Martigny (S. Bender).

Ibis falcinelle, Sichler: 1 ind. le 1.10 à Monthey (W. & M. Dubouloz; homologué CAVS), première donnée depuis 1968.

Canard chipeau, Schnatterente: une troupe hiverne au Bouveret: 31 le 2.1 puis 39 le 3.2 et 51 le 9.2 (jEr). — **Sarcelle d'hiver, Krickente:** 1 ind. à Grône le 2.8 (adJ, liM) puis 5 ind. passent à Martigny entre le 12.8 et le 24.10 (beP). Hivernage d'une douzaine d'ind. à Grône en janvier-février (aLu, iSi). — **Canard colvert, Stockente:** bon hivernage à Grône avec 101 ind. le 30.1 et 143 le 20.2 (iSi; aLu). — **Sarcelle d'été, Knäkenste:** étonnement beaucoup d'observations pour un automne: 1 ind. le 2.8 à Grône (adJ, liM) puis 2-1 du 3.8 au 5.9 entre Martigny et Fully (beP). — **Nette rousse, Kolbenente:** 1 f. le 19.2 à Grône (Rey). — **Fuligule milouin, Tafelente:** plusieurs observations sur la fin de l'hiver, difficiles à séparer des premiers migrateurs: 1 les 20-21.2 à Grône (aLu, rLu, ...), 7 le 20.2 à Sion (beP) et 3 à 7 entre le 27.2 et le 10.3 à Collonges (jeF, beP). — **Fuligule nyroca, Moorente:** 1 m. hiverne à Châteauneuf (Y. Crettenand), le premier cas de ce genre en Valais; 1 ind. le 28.2 à Granges (Rey) concerne probablement le même oiseau en balade. — **Fuligule morillon, Reiherente:** 1 m. le 31.12 à Martigny (beP). — **Eider, Eiderente:** 5 le 2.1 au Bouveret (jEr), probablement des vagabonds de la troupe des Grangettes VD. — Fait nouveau, le **Harle bièvre, Gänsesäger** hiverne en Valais, en dehors du périmètre lémanique: à Saint-Maurice, au bord du Rhône, 1 à 8 ind. sont présents de fin janvier à fin février (beP).

Bondrée, Wespenbussard: passage signalé au col des Vernes/Vouvry le 14.9 (7 ind.; aLu); dernière le 14.10 au col de Bretolet (aLu). — **Milan royal, Rotmilan:** 1 attardé les 29.10 et 2.11 à Vionnaz (ES). — **Gypaète, Bartgeier:** une observation le 4.8 sur Reckingen (D. Moser G) puis 1 imm. ou subad. du 24.8 au 13.9 vers le col de Cou (P. Mosimann, dBd G) sont suivis des «traditionnelles» données de l'Entremont: Balthazar hante le val de Bagnes entre le 10.11 et le 5.2 au moins (div. obs. G) et un subad. est observé du 13 au 15.11 à Bourg-Saint-Pierre (T. Roduit, J.-Cl. Tornay G). — **Busard des roseaux, Rohrweihe:** en dehors du val d'Illiez, des migrateurs le 23.8 au col du Jorat/Evionnaz (Rey), le 5.10 à Martigny (beP) et le 6.10 sous le Simplon 1'400 m (Ch. Vogel). — **Busard Saint-Martin, Kornweihe:** beaucoup d'observations en plaine: premier le 6.10 à Vionnaz (ES) puis passage massif le 31.10 dans la plaine du Rhône en aval de Martigny: 13 ind. différents entre Vouvry et Martigny (beP, eRe). En novembre, max. de 3 le 2 à Vionnaz (ES) et notamment des isolés le 7 à Guttet et le 14 à Leuk (jcT) puis 1 le 3.1 à Baltschieder (Ker) et absence jusqu'à fin février dans le Chablais. — **Autour, Habicht:** des isolés en hiver à Martigny (cK), Ardon, Chamoson, Grône et Leuk (jcT), Rotafen, Ausserberg et Visp (Ker). — **Epervier, Sperber:** migre également

le 14.9 au col des Vernes/Vouvry (aLu).

Faucon émerillon, *Merlin*: apparaît les 8, 15 et 25.11 à Vouvry (jEr, beP) et le 14.11 à Martigny (phB, beP). — **Faucon hobereau, *Baumfalke***: 1 seule donnée de plaine, le 10.10 à Martigny (beP).

Gelinotte, *Haselhuhn*: 1 le 31.10 à Champex et 2 le 7.11 sur Ravoire/Martigny (beP); 1 le 4.1 à Bourg-Saint-Pierre (jcT). — **Lagopède, *Alpenschneehuhn***: 1 le 4.10 au col de Bretolet (cHa), 4 le 11.10 à la Dent de Vallère/Val d'Illiez (Ph. Lebrun NO), puis isolés le 21.12 sur Hérémence 2'500 m (Gey), le 27.12 sur Conthey 2'420 m, le 30.12 sur Bourg-Saint-Pierre 2'000 m et le 22.1 sur Törbel à 2'760 m (jcT). — **Tétras-lyre, *Birkhuhn***: notamment 4 le 21.12 sur Hérémence 2'300 m (Gey), 4 le 27.12 sur Conthey 1'900 m (jcT) et 4 le 21.1 à la cabane Brunet/Bagnes (rLu).

Perdrix bartavelle, *Steinhuhn*: dans le Valais romand, les données proviennent de Bourg-Saint-Pierre 1'900 m, d'Ardon 1'220 m (jcT), de Fully (beP), d'Icogne 1'180 m (iSi), d'Eison/Saint-Martin (Gey) et de la Forcla/Hérens (rLu, St. Voisard).

Râle d'eau, *Wasserralle*: durant tout l'automne à Vionnaz (ES); 1 ind. le 26.12 à Saillon (beP) et 4 le 23.2 à Fully (rA). — **Râle des genêts, *Wachtelkönig*** 1 capture le 26.9 au col de Bretolet (P. Mosimann), la 4^e en ce lieu¹². — **Poule d'eau, *Teichhuhn***: de fortes concentrations d'hivernants sont signalées: 10 ind. le 5.1 à Grône (Rey) et 18 ind. le 23.2 sur quelques dizaines de mètres le long d'un canal à Fully (rA). — **Foulque, *Blässhuhn***: max. de 150 le 6.11 à Grône et de 98 le 30.1 (aLu; iSi).

Grand Gravelot, *Sandregenpfeifer*: 2 migrateurs nocturnes le 17.9 au col de Bretolet (Leu). — **Vanneau, *Kiebitz***: des avant-coureurs isolés en août: le 1^{er} à Leuk (gaD, beP) et le 24 à Martigny puis bon passage (50 ind.) entre le 14 et le 22.11. Toujours à Martigny, une tentative d'hivernage d'un j. le 31.12, retrouvé mort en janvier (beP).

Bécasseau minute, *Zwergstrandläufer*: 1 j. le 4.10 à Saillon (phB, beP). — **Bécassine sourde, *Zwergschnepfe***: 1 ind. du 13 au 20.12 à Martigny (beP). — **Bécassine des marais, *Bekassine***: première le 30.7 au Simplon 1'850 m (cK, jeF) puis bon passage à Martigny jusqu'au 23.10 (beP). Seul indice d'hivernage: 1 le 13.1 à Muraz (rhT NO). — **Chevalier gambette, *Rotschenkel***: 1 hâtif le 28.6 à Leuk (Sch). — **Chevalier aboyeur, *Grünschenkel***: 1 les 8-9.8 à Leuk (liM, rLu). — **Chevalier culblanc, *Waldwasserläufer***: passe entre le 6.6 et le 18.8 à Martigny (beP); 2 migrateurs nocturnes le 14.9 au col de Bretolet (Leu). Des hivernants passagers, le 2.12 à Grône (jcT) et les 25-26.2 à Monthey (rV). — **Chevalier sylvain, *Bruchwasserläufer***: 1 migrateur à début août au pas de Lona 2'750 m (rA), puis 1 le 2.8 à Grône (adJ, liM), 1 du 8 au 11.8 à Martigny (beP) et 2 migrateurs nocturnes le 13.9 au col de Bretolet (Leu). — **Chevalier guignette, *Flussuferläufer***: notamment 1 le 3.9 au lac du Louché/vallon de Réchy 2'500 (rLu) et un dernier le 4.10 à Vernayaz (phB); un hivernant le 28.2 à la Porte-du-Scex (beP).

Mouette rieuse, *Lachmöwe*: 1 ind. pris en chasse par un Epervier le 14.2 à Sembrancher (phB). — **Goéland leucopnée, *Weisskopfmöwe***: 1 ind. franchit le col de Bretolet le 30.9 (cHa). — **Goéland indéterminé, *unbest. Grossmöwe***: 1 juv. le 28.6 au lac de Fenêtre/val Ferret (eRe) et 3 le 9.10 au col de Bretolet (cHa).

Pigeon colombin, *Hohлтаube*: dernier le 14.11 à Martigny (beP). — **Pigeon ramier, *Ringeltaube***: dernier le 21.11 à Martigny (beP). — **Tourterelle des bois, *Turteltaube***: dernière le 8.10 à Leuk (Rey) et encore 1 attardée le 17.10 à Muraz (beP).

Chouette chevêchette, *Sperlingskauz*: le 11.9 au-dessus de Martigny (J.-Ph. Glassey) et le 28.12 à Greich (mEi).

Martinet noir, *Mauersegler*: dernier le 29.9 à Martigny (beP). — **Martinet alpin, *Alpensegler***: max. d'une 50^e le 23.8 sur Martigny (beP).

Martin-pêcheur, *Eisvogel*: à Grône, 2 le 10.11 et 1 le 2.12 (jcT) et 3 le 13.1 entre Muraz et Les Evouettes (rhT NO).

Huppe, *Wiedehopf*: dernière le 21.8 à Martigny (beP).

Pic épeichette, *Kleinspecht*: 1 le 23.1 à Ausserberg (rLu).

Alouette lulu, *Heidelerche*: au col de Bretolet, notamment 14 le 5.10 et 22 le 6 (cHa); encore 2 le 14.11 à Rotafen (jcT).

Hirondelle de rivage, *Uferschwalbe*: 3 migrateurs hâtifs le 27.7 à Raron (Sal); dernière le 4.10 à Martigny (beP).

Pipit rousseline, *Brachpieper*: isolés les 9 et 24.9 à Martigny (beP); 2 le 13.9 et 1 le 28 au col de Bretolet (cHa). — **Pipit farlouse, *Wiesenpieper***: 13 le 13.1 entre Muraz et Les Evouettes (rhT NO). — **Pipit spioncelle, *Wasserpieper***: des comptages crépusculaires d'un dortoir à Vionnaz donnent les chiffres suivants: 35 ind. le 15.1, 60 le 3.2, 107 le 13.2, 57 le 25.2 et 10 le 2.3 (ES NO). — **Bergeronnette grise, *Bachstelze***: 4 ind. à fin décembre à Fully (beP), 1 le 10.1 au Bouveret (G. Gilliéron NO), 1 le 13.1 entre Muraz et Les Evouettes (rhT NO) et 10 le 31.1 à Evionnaz (beP).

Accenteur mouchet, *Heckenbraunelle*: hivernants en décembre-janvier à Fully, entre 460 et 870 m (beP). — **Accenteur alpin, *Alpenbraunelle***: rencontré le 17.1 à 2'800 m sur Evolène (jcT). — **Rougequeue noir, *Hausrötel***: 2 le 6.12 à Martigny (beP). — **Traquet tairier, *Braunkehlchen***: 1 le 19.8 au val de Moiry 2'700 m (rLu). — **Traquet pâtre, *Schwarzkehlchen***: encore 4 ind. le 1.11 et 1 le 14 à Martigny (beP). — **Grive litorne, *Wacholderdrossel***: un dortoir à Vionnaz compte 23 ind. le 2.11, 45 le 30.11, 24 le 3.2 et 13 le 10.2; 30 le 27.1 à Ovronnaz 1'300 m (ES NO).

Locustelle tachetée, *Feldschwirl*: dernière le 23.9 à Martigny (beP). — **Locustelle lusciniode, *Rohrschwirl***: 1 le 11.8 à Martigny (beP), 4^e observation valaisanne. — **Phragmite des joncs, *Schilfrohrsänger***: isolés les 21.7 et 24.8 à Leuk (Rey). — **Rousserolle turdoïde, *Drosselrohrsänger***: 1 migratrice le 6.8 à Martigny (beP). — **Hypolaïs icterine, *Gelbspötter***: 1 le 9.8 et 2 le 11 à Martigny (beP). — **Hypolaïs polyglotte, *Orpheusspötter***: 1 ind. le 20.9 au col de Bretolet, pour la 2^e fois en ce lieu!¹² — **Fauvette épervière, *Sperbergrasmücke***: un ind. 1^{er} hiver capturé le 12.8 au col de Bretolet (P. Mosimann¹²), homologué CAVS. — **Fauvette à tête noire, *Mönchgrasmücke***: 1 c. le 29.11 à Martigny (rhT NO). — **Pouillot vélocé, *Zilpzalp***: 1 ind. 1^{er} hiver de la ssp. *tristis* capturé le 15.10 au col de Bretolet (P. Mosimann)¹², homologué CAVS. Plusieurs mentions d'hivernants, fait rare: 1 le 26.12 à Martigny et 2 le 27.12 à Fully (phB, beP, eRe) puis 6 le 13.1 entre Muraz et Les Evouettes (rhT NO) et 1 le 28.2 au Bouveret (beP). — **Pouillot fitis, *Fitis***: dernier le 28.9 à Martigny (beP).

Gobemouche à collier, *Halsbandschnäpper*: un ind. 1^{er} hiver capturé le 2.8 au col de Bretolet (P. Mosimann, R. Winkler¹²), homologué CAVS.

Tichodrome, *Mauerläufer*: en altitude, 1 ind. le 6.12 à Fionnay 1'500 m par 60 cm de neige fraîche (phB, beP); sur le bas-coteau, 1-2 ind. à Fully (cK, beP) et 1 le 18.1 à Leuk (jcT).

Mésange rémiz, *Beutelmeise*: passage étiré mais faible, entre le 28.9 et le 1.11 à Martigny (beP); ailleurs, 2 le 19.9 à Grône (Rey) et 1 ind. le 30.9 à Collombey (beP).

Pie-grièche écorcheur, *Neuntöter*: des attardées isolées à Martigny, le 10.10 puis du 23.10 au 1.11 (beP).

Pie, *Elster*: hiverne en altitude: 2 ind. le 21.1 à Ovronnaz 1'300 m (ES NO). — **Cassennoix, *Tannenhäher***: cris le 19.8 dans le val de Moiry à 3'000 m (rLu)! 2 ind.

en plaine le 10.9 à Martigny (beP). — **Chocard, *Alpendohle***: 450 le 20.12 à Leytron et 200 le 23.1 à Ovronnaz (ES NO). — **Crave, *Alpenkrähe***: notamment 2 le 1.11 au Bec de Bosson/vallon de Réchy 3'000 m par un mètre de neige au sol (rLu) et 9 le 2.2 sur La Fouly/Ferret 1'850 m (jcT). — **Corneille noire, *Rabenkrähe***: une 100^e à Saint-Martin le 20.12 se nourrissent sur une décharge avec 200 **Grands Corbeaux, *Kolkrabe*** (aLu).

Etourneau, *Star*: 1 le 20.12 et 2 le 8.1 à Martigny (beP).

Niverolle, *Schneefink*: quelques groupes, notamment une 15^e le 23.12 au Pas de Lona/vallon de Réchy 2'900 m et une 20^e le 9.1 sur Mase 2'800 m (Gey).

Serin, *Girlitz*: quelques hivernants en février: une 15^e le 6 à Vernayaz, une 20^e le 20 à Sion et 5 le 28 à Saxon (beP). — **Venturon, *Zitronenzeisig***: isolés ou en petites troupes, dont 3 ch., le 21.12 entre Nax et Saint-Martin (Gey), puis 1 le 10.1 à Fionnay (aLu), une 20^e le 7.2 sur Sembrancher (beP, eRe) et 2 le 9.2 à Mollens (Rey). — **Chardonneret, *Distelfink***: plusieurs mentions de décembre, avec 2 le 5 et 5 le 31 à Fully puis 1 le 6 à Fionnay 1'560 m par 60 cm de neige (beP); ensuite, vu à Montana le 31.1. (Rey) et 1 le 20.2 à Grône (beP). — **Tarin, *Erlenzeisig***: 200 le 6.12 à Fionnay 1'560 m (beP) et 50 le 20.12 à Saint-Martin 1'800 m (aLu). — **Sizerin, *Birkenzeisig***: 6 le 14.2 à Sion (rhT NO). — **Grosbec, *Kernbeisser***: le 8.10, une 10^e passe au col de Bretolet ainsi qu'une 50^e le 9 (cHa); hivernants à Icogne 1'180 m (iSi), Chermignon (Rey) et Ausserberg 1'550 m (Ker).

Bruant jaune, *Goldammer*: 12 ind. le 23.1 à Ovronnaz 1'300 m (ES NO). — **Bruant fou, *Zippammer***: hivernants en décembre à Martigny et Fully (beP). — **Bruant ortolan, *Ortolan***: 6 le 10.9 à Martigny (beP). — **Bruant des roseaux, *Rohrammer***: 1-5 hivernants à Martigny (beP). — **Bruant proyer, *Graumammer***: 1 le 10.10 à Martigny (beP).

LE PRINTEMPS ET L'ETE 1993

Dans les tendances météorologiques générales, nous noterons un moins d'avril exceptionnel par son humidité (100% au-dessus de la moyenne) et des mois d'été très secs. Parmi les migrateurs printaniers, l'**absence du Milan royal** et le **faible passage de faucons** étonnent. A l'opposé, des **tempêtes de fœhn** ont déferlé sur le canton durant presque dix jours à la fin d'avril et au début de mai, ce qui a déporté plusieurs espèces méditerranéennes, comme bien souvent dans ces cas-là. Cette année, les alouettes tiennent la tête d'affiche avec une **nouvelle vague de Calandrelles** et des **apparitions groupées de Calandres**; peu après, un **Traquet oreillard** est identifié pour la première fois dans le canton. Ces coureurs des champs auraient-ils mobilisé toutes les énergies pour ne pas avoir remarqué de fauvettes venues du sud? Cet été valaisan est placé pour la troisième année consécutive sous l'emprise du **Circaète** qui montre des effectifs probablement jamais atteints depuis le début du siècle; à l'opposé de l'ambiance sèches des coteaux, des observations presque simultanées de **Sterne caugek** et de **Mouette mélanocéphale** en Valais central apportent une fraîcheur quasi lacustre au tableau estival.

Der April 1993 war um hundert Prozent zu feucht, die Sommermonate sehr trocken. Auf dem Frühjahrszug fehlte der Rotmilan; Falken sowie Kampfläufer blieben erstaunlich spärlich. Auf der anderen Seite brachten zehntägige Föhnstürme Ende April/Anfang Mai verschiedene mediterrane Gäste. Diese Jahr waren Kurzzeihenlerchen und gleich gruppenweise auftretende Kalendarlerchen die Attraktion; wenig später wurde erstmals ein Mittelmeersteinschätzer im Kanton gesichtet. Seltene Grasmücken fehlten hingegen wieder. Zum dritten Mal hintereinan-

der stand der Sommer im Zeichen des **Schlangennadlers**, der nun zahlenmässig so häufig war wie wohl nie mehr seit Beginn des Jahrhundert. Eine frische Brise in die trockene Walliser Steppe brachten dafür eine **Brandseeschwalbe** und eine **Schwarzkopfmöwe**.

Grèbe huppé, Haubentaucher: 3 isolés, le 11.3 à Grône (iSi), les 7-11.4 à Martigny (beP) et le 12.4 à Granges (Rey).

Cormoran, Kormoran: en faible mouvement entre le 10.3 et le 18.4 (jeF, beP), remarqué dans la région de Martigny; ailleurs, 1 le 17.3 à Granges (Rey).

Blongios, Zwergreiher: présent dès le 5.5 à Leuk (liM, beP). — Le **Bihoreau, Nachtreiher** n'apparaît qu'à Grône (max. de 3 du 15 au 17.4; iSi, beP, Rey) et Leuk avec cependant des groupes de 6 ind. le 28.4 et de 4 le 20.5 (beP); passage très localisé mais abondant. Encore 1 erratique le 2.7 à Grône (Rey). — **Crabier, Rallenreiher**: 1 ind. les 22-23 et 30.5 à Leuk (P.-A. Ravussin, ...). — **Aigrette garzette, Seidenreiher**: très bonne fréquence avec 17 dates, principalement à Grône; 1 hâtive ouvre le passage le 1.4 à Salgesch (Rey), puis à Grône le 3.4 où il culmine avec 7 ind. le 2.5 (Zur); dernier migrateur du 17 au 20.5 à Martigny (cK, beP). — **Héron cendré, Graureiher**: 13 ind. le 1.7 à Saint-Maurice (beP). — **Héron pourpré, Purpureiher**: 1 le 21.4 à Grône (Rey) puis 10 dates du 27.4 au 20.5 à Leuk avec max. de 4 le 16.5 (liM, pUn) et enfin 1 ind. le 26.5 à Martigny (beP).

Cigogne blanche, Weissstorch: 1 seul migrateur, le 13.4 en vol à Martigny (M.-F. Cattin).

Canard siffleur, Pfeifente: 2 le 27.3 à Grône (Rey, iSi). — **Canard chipeau, Schnatterente**: 1 le 15.3 puis 2 le 27 à Grône (iSi) et 2 le 4.4 à Leuk (rLu, L. Camenzind). — **Sarcelle d'hiver, Krickente**: 4 données en mars-avril dans la région de Martigny (beP) puis 1-2 ind. les 2 et 10.5 à Grône (Sal, Zur; iSi). — **Canard pilet, Spiessente**: à Grône uniquement, 1 m. du 9 au 17.4 (Rey, iSi, beP). — **Sarcelle d'été, Knäkenste**: 10 ind. le 15.3 à Granges (iSi), puis passage modeste jusqu'au 15.4 à Grône; autres localités: 5 fois à Martigny et 1 fois le 25.3 à Collombey (beP). — Le **Canard souchet, Löffelente**, a été peu vu ce printemps: isolés les 7-8.4 à Martigny (beP) et 11.4 à Grône (Rey). — **Fuligule milouin, Tafelente**: 1 f. le 12.4 à Leuk (Rey). — Les premiers mouvements du **Harle bièvre, Gänsesäger**, de plus faible ampleur que ceux des années passées, sont décelés dès le 6.3 dans la région du Coude du Rhône et jusqu'à Saint-Maurice, où 3 attardés sont vus le 1.5 (beP).

Bondrée, Wespenbussard: en escapade estivale jusqu'à 2'700 m le 8.7 au-dessus de Conthey (Gey). — **Milan noir, Schwarzmilan**: premier hâtif le 28.2 à Monthey (beP). — Aucun **Milan royal, Rotmilan** ce printemps! — **Gypaète, Bartgeier**: principalement observé dans le Valais central entre mars et mai (Chamoson, Ardon, Conthey, Savièse G) puis 2 oiseaux le 6.6 sur Tanay/Vouvry (H. Brünner G), le 17.6 au col du Simplon (P. Blaser G), le 19.6 à Vex (G) et 1 ind. le 3.7 dans le Fischertal (R. Rickli G). — **Circaète, Schlangennadler**: les observations se multiplient et atteignent des proportions insoupçonnées: signalé déjà en avril à Lens, Grône, Chippis et Mund (paO; Rey; tWy), le Circaète apparaît le 9.5 à Fully (jeF, beP, ...) puis le 23 à Dorénaz (phB) et le 29 à Leuk (adJ). En juillet et août, au moins 4 ind. différents ont été reconnus entre Fully et Saillon (beP), ce qui mène à un total de 7-8 ind. observés cette année, migrateurs et estivants confondus! — **Busard des roseaux, Rohrweihe**: passage assez maigre, entre le 23.3 à Grône (iSi, Rey) et le 20.5 à Leuk (beP) en 5 localités en tout; à noter 1 erratique le 21.6 à Leuk (Rey). — **Busard Saint-Martin, Kornweihe**, les 7 et 10.3 à Vionnaz (paB) et le 12.4 à Baltschieder (Ker). — **Busard cendré, Wiesenweihe**: en trois localités, le 28.4 et

- le 15.5 à Leuk (beP; G. Kunz), le 20.5 à Turtmann (beP) et les 5-6.5 au Bouveret (Str). — **Buse, Mäusebussard**: 2 le 7.4 sur Hérémente à 2'600 m (Gey). — **Aigle royal, Steinadler**: à signaler un regroupement exceptionnel de 9 ind. le 12.3 à Derborence (rA).
- Balbusard, Fischadler**: au moins 1 le 11.4 à Raron (tWy) puis 1 le 30.4 à Grône (Rey).
- Faucon kobez, Rotfussfalke**: 1 seule observation, celle d'une f. le 2.5 à Ardon (gaD).
- **Faucon émerillon, Merlin**: 1 le 10.3 à Vouvry (paB), le seul de ce printemps.
- **Faucon hobereau, Baumfalke**: des isolés le 2.5 à Leuk et le 14.5 à Martigny (liM, beP). — **Faucon pèlerin, Wanderfalke**: quelques observations d'altitude, le 6.7 sur Evolène 2'000 m (Gey) et à Bourg-Saint-Pierre 1'770 m (jcT) et le 31.7 dans le Binntal à 2'500 m (mEi).
- Caille, Wachtel**: premières le 28.4 à Martigny (liM) et Leuk (beP).
- Râle d'eau, Wasserralle**: 1 le 27.3 à Grône (iSi). — **Marouette ponctuée, Tüpfelsumpfhuhn**: 1 les 17-18 et 25.3 à Grône (Rey; iSi).
- Petit Gravelot, Flussregenpfeifer**: 13 observations entre le 3.4 (Baltschieder; Zur) et le 19.5 (Leuk; beP) avec max. de 9 le 10.4 à Martigny (beP). — **Vanneau, Kiebitz**: bon passage printanier, ce qui n'est plus arrivé depuis 1989: arrivée massive dès le 20.2 à Vouvry (rV), le 21 à Vionnaz et Collonges (phB, beP); les maxima sont notés les 14.3 (69 ind.; beP) et 30.3 (40 ind.; rV) à Vouvry; enfin, 1 attardé le 7.5 à Martigny (beP).
- Combattant, Kampfläufer**: 1 le 22.3 à Grône (Rey) et 2 le 30 à Vouvry (rV). — **Bécassine des marais, Bekassine**: 9 dates entre le 12.3 et le 7.4, dont 3 ind. le 17.3 à Grône (Rey). — Trois observations du **Chevalier gambette, Rotschenkel**, le 22.3 à Grône (iSi), les 25 et 28.3 à Fully (beP) et le 16.5 à Leuk (pUn). — **Chevalier culblanc, Waldwasserläufer**: du 11.3 au 2.5 à Grône (Rey, Sal, iSi, Zur), le 28.3 à Visp (S), le 3.4 à Baltschieder (Zur) et les 10-11.4 à Martigny (beP). — Bonne fréquence du **Chevalier sylvain, Bruchwasserläufer**, entre le 16.4 et le 7.5 à Grône et Leuk (aLu, beP, iSi). — **Chevalier guignette, Flussuferläufer**: quasi absent: isolés les 5.4 et 25.5 à Granges (Rey; aLu), le 6.5 à Leuk (Rey) et le 8.5 à Martigny (beP).
- Mouette mélanocéphale, Schwarzkopfmöwe**: un ad. nuptial le 9.7 à Martigny (aSi), date insolite et 2^e mention valaisanne! — Six observations de la **Mouette rieuse, Lachmöwe** dont 17 ind. le 7.5 à Grône (iSi). — **Goéland leucophaée, Weisskopfmöwe**: 14 migrants le 14.5 et 1 le 15 à Martigny puis un isolé le 12.6 à Leuk (beP).
- Sterne caugek, Brandseeschwalbe**: 1 ind. pêche toute la journée aux Iles de Sion (Gey), également une 2^e observation pour le Valais. — **Guifette noire, Trauerseeschwalbe**: bonne fréquence avec des isolés le 25.4 à Sierre (liM) et les 7 et 22.5 à Grône (aLu, iSi); enfin, à Leuk, 3 le 12 et 1 le 18.5 (Rey; liM). — **Guifette leucoptère, Weissflügelseeschwalbe**: un passage surprenant à fin mai, concerne peut-être les mêmes individus: le 28.5, 1 ind. à Leuk (T. Guillaume) et le 29.5, 2 à Sion (mD).
- Tourterelle des bois, Turteltaube**: première le 28.4 à Turtmann (beP); max. de 9 les 6 et 12.5 à Leuk (Rey).
- Coucou, Kuckuck**: 2 premiers le 18.4 à Icoigne (iSi).
- Martinet à ventre blanc, Alpensegler**: 4 premiers le 18.4 à Brig (mEi).
- Martin-pêcheur, Eisvogel**: 1 les 15.3 et 13.4 à Grône (iSi) et le 21.3 à Baltschieder (tWy).
- Huppe, Wiedehopf**: première hâtive le 19.3 à Saillon (A. Praz); à noter une migratrice dans le Chablais, le 20.4 à Collombey-Muraz (jcT) et dans le Val d'Anniviers, le 16.4 à Saint-Luc 1'650 m (M.-F. Cattin).
- Torcol, Wendehals**: premier le 3.4 à Brig (mEi).

Alouette calandre, *Kalanderlerche*: une dizaine de jours de foehn à fin avril ont engendré une «invasion» en Suisse: alors que cet oiseau avait été observé 4 fois depuis le début du siècle, des observations en 7 localités portant sur 10 ind. ont été notées cette année, dont, pour le Valais, 1 ind. les 27-28.4 et 2.5 à Martigny (Ch. Widmann, liM, hDu, beP), 1 les 2-8-16.5 à Leuk (liM, hDu, T. Guillaume) et 1 ch. le 11.5 à Ausserberg (R. Wüst, A. Hofer), tous homologués CAVS! — **L'Alouette calandrelle, *Kurzzechenlerche*** a précédé de peu la Calandre pour se manifester en Suisse comme jamais auparavant: 15 observations portant sur 26 ind. au minimum! C'est en Valais que cette invasion a été la plus remarquée: 6 ind. différents ont passé entre le 25.4 et le 7.5 à Martigny (hDu, liM, beP), puis à Leuk, 3 le 28.4 et 2 le 2.5, 1 les 18-19.5 et 2 le 20, suivis de 2 autres le 22 (cB, hDu, liM, beP, ...) et enfin 1 ind. le 14.5 à Vouvry (liM). Toutes ces observations ont été homologuées par la CAVS. — **Alouette lulu, *Heidelerche***: 10 migratrices le 14.3 à Brunnen (Rey).

Hirondelle de rivage, *Uferschwalbe*: encore une 20^e le 12.6 à Leuk et dernière le 13.6 à Martigny (beP). — **Hirondelle de rochers, *Felsenschwalbe***: 3 premières hâtives le 19.2 à Brig (mEi). — **Hirondelle de cheminée, *Raubschwalbe***: 2 premières tardives le 30.3 à Martigny (aLu).

Pipit rousseline, *Brachpieper*: faible passage entre le 10.4 à Martigny (beP) et le 16.5 à Leuk (rLu, liM). — **Pipit à gorge rousse, *Rotkehlpieper***: une seule donnée, qui concerne cependant le plus grand groupe observé en Valais: 5 le 8.5 à Leuk (liM).

Rossignol, *Sprosser*: premier le 12.4 à Visp (Ker). — **Gorgebleue, *Blaukehlchen***: trois observations, toutes de mars: 1 m. le 20 à Ardon (gaD), 1 m. à miroir blanc le 28 à Visp (tWy) et 1 f. le 31 à Martigny (beP). — **Rougequeue noir, *Hausrötel***: retour amorcé le 14.3 à Ardon (aLu). — **Traquet tarier, *Braunkehlchen***: premier le 9.4 à Bratsch (Sal). — **Traquet pâtre, *Schwarzkehlchen***: premier hâtif, ou hivernant, le 18.2 à Ausserberg (Zur); en général retour tardif, dès mi-mars. — **Traquet motteux, *Steinschmätzer***: 2 premiers le 23.3 à Martigny (beP). — **Traquet oreillard, *Mittelmeersteinsmätzer***: 1 m. à gorge blanche le 22.5 à Mund 800 m (mEi; homologué CAVS), première observation en Valais.

Bouscarle, *Seidensänger*: 1 ind. muet le 2.5 à Leuk (beP; homologué CAVS), 3^e observation valaisanne. — **Locustelle tachetée, *Feldschwirl***: petit passage en 7 localités du 17.4 à Martigny (beP) au 18.5 à Leuk (liM). — **Rousserolle turdoïde, *Drosselrohrsänger***: dès le 5.5 à Leuk (beP). — **Hypolaïs icterine, *Gelbspötter***: 2 migrants ch. le 16.5 à Fully (jeF). — **Fauvette babillarde, *Klappergrasmücke***: première le 18.4 à Greich (mEi). — **Pouillot fitis, *Fitis***: dernier le 14.5 à Veyras (Rey).

Mésange rémiz, *Beutelmeise*: 4 le 31.3 à Ardon (gaD) puis 1 le 10.4 à Martigny et 4-3 les 12 et 16.4 à Grône (Rey; beP).

Loriot, *Pirol*: apparaît le 2.5 à Leuk (liM).

Pie-grièche écorcheur, *Neuntöter*: première le 1.5 à Zeneggen (P. Baechler).

Choucas, *Dohle*: 1 le 23.3 à Martigny, le 17.4 à Fully et 2 le 28.4 à Leuk; 40 le 1.7 à Monthey doivent provenir de la colonie de Saint-Triphon VD (beP). — **Corbeau freux, *Saatkrähe***: env. 130 le 27.2 à Vouvry (ES NO) sont probablement les premiers migrants. — **Corneille noire, *Rabenkrähe***: 3 le 16.7 à Eison/Saint-Martin 2'300 m, dont une hybride mantelée (Gey). — **Corneille mantelée, *Nebelkrähe***: des hybrides signalés en avril à Grône et Leuk (iSi; rLu).

Niverolle, *Schneefink*: 55 en trois groupes le 8.4 à Saint-Martin (Gey).

Venturon, *Zitronenzeisig*: une 30^e le 6.3 à Vérossaz (jeF) sont probablement de retour. — **Grosbec, *Kernbeisser***: notamment un groupe de 35 le 21.3 à Vernamiège (gCa, aLu, rLu, ...).

Bruant ortolan, Ortolan: premier à Ried/Mörel 1'100 m le 24.4 (mEi). — **Bruant proyer, Grauammer:** 2 migrants le 7.4 à Collonges (beP).

INDICES DE NIDIFICATION EN 1993

La reproduction fut assez bonne en Suisse malgré les quelques vicissitudes printanières. En Valais, l'actualité de cet été semble plutôt encourageante avec la découverte de **nouvelles aires de croule de Bécasse** et l'étendue de la **prospection de Chouette chevêchette**; cette dernière a d'ailleurs permis de retrouver la trace du **Pic tridactyle**. Au programme des surprises estivales, il faut signaler la **nidification réussie du Chocard en plaine**. Sur l'ensemble du canton, comme dans le reste du pays, les **Cailles ont été plus fréquentes**. Les **Guêpiers** ont tout aussi bien niché que l'an passé, le **Pipit rousseline** reste cantonné sur les coteaux hauts-valaisans et le **Milan noir semble poursuivre sa progression**. Quant au **Bruant proyer**, le nombre de chanteurs entendus rassure quelque peu. Seule ombre remarquable à ce portrait estival, les effectifs de **Huppe** dans la région de Fully...

Insgesamt war die Brutperiode 1993 in der Schweiz trotz einigen Schlechtwetterperioden im Frühjahr recht gut. Im Wallis waren die Neuigkeiten des Sommer recht ermutigend, mit weiteren Balzplätzen der Waldschnepfe und einer Ausdehnung der Suche nach dem Sperlingskauz, die auch wieder auf die Spur des Dreizehenspechtes führte. Überraschenderweise brütete die Alpendohle im Talgrund. Im ganzen Kanton wie auch landesweit waren die Wachteln häufig. Die Bienenfresser brüteten ebenso erfolgreich wie im Vorjahr. Der Brachpieper behauptete sich an seinem Brutplatz am Südhang und der Schwarzmilan schien sein Verbreitungsgebiet weiter auszudehnen. Die Zahl der singenden Grauammern stellte eine Bestätigung dar. Einziger Schatten auf diesem Sommer bildete wiederum die schwindenden Wiedehopf-Bestände in der Gegend von Fully ...

Grèbe huppé, Haubentaucher: la colonie du port du Bouveret est prospère: le 2.7, 1 famille est observée ainsi que 3 nids en construction et 8 avec une couveuse (beP).

Blongios, Zwergreiher: 2 ind., dont un m. ch., à fin mai à Ardon (gaD); nidification certaine à Leuk avec 3 j. et 1 ad. le 24.7 (M.-F. Cattin, beP). — **Héron cendré, Graureiher:** des ind. nuptiaux sont à nouveau présents à fin mars à Martigny (beP); présence continue en mars-avril à Grône (iSi); 1 le 18.5 à Leuk (liM).

Nette rousse, Kolbenente: 1 m. et 2 f. familiers le 2.7 au Bouveret (beP) peuvent laisser supposer une tentative de nidification; il y a eu des jeunes observés sur le Léman cette année, aux Grangettes VD et à Vevey.

Bondrée, Wespenbussard: signalée dans la vallée du Rhône jusqu'à Mörel. — **Milan, Schwarzmilan:** le 4.4, un oiseau couve dans une peupleraie à Finges (rLu, aSi), preuve de nidification certaine qui vient étayer les observations de ces dernières années. La progression continue en amont avec notamment 1 ind. en mue le 27.6 à Gampel (beP). — **Epervier, Sperber:** à noter 1 ind. le 5.7 à Tanay (Str). — **Aigle, Steinadler:** notamment 1 le 5.7 à Tanay (Str), seul indice pour le Chablais.

Faucon crécerelle, Turmfalke: dans le val d'Hérens, 3 c. à Vex, 1 à Mase, 2 à Hérémece, 2 à Saint-Martin et 2 à Evolène (Gey). — **Faucon pèlerin, Wanderfalke:** sur les différents indices, au moins une nidification réussie dans le Haut-Valais.

Gelinotte, Haselhuhn: indices de présence au-dessus de Martigny (des ch. et 1 famille; rA, beP), près de Bovernier (aSi), aux Mayens de Bruson (rLu, St. Voisard) et à Visp (tWy). — Beaucoup de données de **Lagopède, Alpenschneehuhn**, dont le

- 28.6 sur Savièse 2'200 m (jcT), à fin juillet, près du Besso au fond du val d'Anniviers 2'790 m (L. Willenegger) et le 27.8 avec 4-5 juv. sur Oberwald (J. Bolliger). — Le **Grand Tétrás**, *Auerhuhn* réapparaît dans les chroniques valaisannes, avec 1 ind. le 14.5 dans le Chablais; niche-t-il encore?
- Perdrix bartavelle**, *Steinhuhn*: notamment dans le Chablais, le 19.6 aux Cornettes de Bise/Tanay (Str) et dans la vallée de Saas, le 3.5 à Saas Balen et le 7.6 à Saas Almagell (Zur). — **Caille**, *Wachtel*: dans la plaine du Rhône bas-valaisanne, 3 ch. le 2.7 à Vouvry (beP) et 1 le 20.5 à Sion, sans suite (aLu); pour la partie haut-valaisanne, 6 ch. à Leuk, 3 à Turtmann, 3 à Gampel (div. obs.) et 1 à Raron (Sal); en altitude, 1 ch. au Simplon 1'850 m le 27.6 (Zur). En résumé, une bonne année.
- Petit Gravelot**, *Flussregenpfeifer*: 1 nid avec 4 œufs le 12.5 à Finges vient à bien: 2 ad. et 4 poussins le 29.6 (Ch. Schmid). — **Vanneau**, *Kiebitz*: 8 m. cantonnés le 14.3 à Vionnaz (beP) et 5 ind., dont certains alarment, le 14.5 à Vouvry (liM).
- Bécasse**, *Waldschnepfe*: croule le 19.5 au-dessus de Vérossaz, le 21.5 au-dessus de Monthey et le 30.5 sur Chemin/Martigny (beP). — **Chevalier guignette**, *Flussuferläufer*: 1 c. le 29.5 à Finges (S).
- Tourterelle des bois**, *Turteltaube*: 1 c. le 18.5 à Leuk (liM) et des isolés le 9.7 à Saillon et Aproz (beP).
- Hibou petit-duc**, *Zwergohreule*: 1 ch. le 29.5 à Arbaz (adJ) et Grimisuat (gaD, jeF, beP). — **Chouette chevêchette**, *Sperlingskauz*: entendue le 19.5 sur Collombey-Muraz 1'690 m et le 16.7 à Vichères/Liddes (beP); le 26.6, un j. ne sachant pas très bien voler est recueilli par des enfants du Trétien/Salvan 1'030 m (jeF), peut-être la preuve de nidification la plus basse pour le canton. Autres données: 2 c. cantonnés sur Martigny (beP), 2 ch. et 1 c. sur 4 km² à Vernamiège entre 1'600 et 2'200 m (aLu), 1 ind. le 15.5 sur Visp 1'200 m (tWy) et 2 le 18.7 sur Brig-Glis 1'720 m (mEi). — **Hibou moyen-duc**, *Waldohreule*: 1 ch. le 21.3 sur Vernamiège 1'900 m (gCa). — **Chouette de Tengmalm**, *Rauhfußkauz*: 2 ch. le 15.3 sur Sembrancher (rA, beP), 1 ch. le 20.3 à Grimentz (jeF), 2 ch. sur Martigny le 18.4 (beP) et 7 ch. sur 4 km² à Vernamiège entre 1'600 et 2'200 m (aLu).
- Engoulevent**, *Nachtschwalbe*: à nouveau 3 ch. à Fully (beP) et quelques-uns dans le Haut-Valais, dont 1 à Gampel (M. Iseli).
- Martin-pêcheur**, *Eisvogel*: nidification probable à Martigny où un site avec 3 trous et 1 ad. discret est découvert le 1.7 (beP); 2 le 29.5 à Salgesch (S) et le 26.6 à Leuk (M. Camici) puis 1 le 9.7 à Saillon (beP).
- Les **Guêpiers**, *Bienenfressern* ont à nouveau niché: le 15.5, arrivée à la colonie de 11 ind. qui formeront à nouveau 5 c.; envol des derniers jeunes le 8.8, 21 à 25 au total (beP, Sal, ...). Succès comparable à celui de l'an passé.
- Huppe**, *Wiedehopf*: cette année encore, plusieurs sites habituels sont inoccupés entre Fully et Saillon (jeF); ch. le 24.4 et jusqu'au 9.5 à Grône (rLu, Rey, Sal, iSi) puis 1 le 26.6 à Saint-Léonard (Rey), ch. les 24.4 et 16.5 à Finges (rLu) et 1 ind. le 19.5 à Collonges est en dehors des sites connus (beP); toujours fréquente dans le haut du canton avec notamment 1 ch. le 13.6 à 1'400 m sur Rotafen (S).
- Pour le **Torcol**, *Wendehals*, quelques «nouveauautés» sont à signaler: dans le Bas-Valais, 1 ch. le 27.5 à Vouvry (jEr, jcT) et 1 le 20.5 à Vérossaz (jeF); en altitude, plusieurs mentions défont les hauteurs pour l'espèce: ch. isolés le 3.7 à Saas Fee 1'850 et 1'860 m (Zur), au printemps à Fäsilalp/Bratsch 1'950 m (M. Iseli) et le 8.7 dans les derniers aroles aux Mayens de Conthey 2'200 m (Gey). — **Pic épeichette**, *Kleinspecht*: par rapport aux années précédentes, signalé également au-dessus de Vérossaz (jeF), à Grimisuat (beP), Lalden (Zur) et Goppisberg (mEi). — **Pic tri-dactyle**, *Dreizehenspecht*: après des années d'«absence», l'espèce est à nouveau signalée dans le canton: tambourinages le 18.4 sur Martigny (beP) et 1 f. ou j. vu le 7.9 à 500 m de là (phB).

Alouette lulu, *Heidelerche*: 2 ind. le 14.3 sur un lieu habituel à Saint-Léonard (aLu, rLu, aSi) et 1 ch. le 29.5 à Ayent (aLu) et 1 autre le 13.5 à Veyras (Rey) sont les seuls du Valais romand; ailleurs, entendue notamment à Salgesch et Varen (L. Schifferli). Quelques pointes en altitude, avec des ch. isolés le 16.6 sur Erschmatt 2'150 m (U. Rehsteiner) et le 19.6 sur Visperterminen 2'170 m (mEi). — Parmi les ch. d'**Alouette des champs, *Feldlerche*** en altitude, notons des isolés le 31.5 sur Bruson 2'300 m et le 1.6 sur les Mayens de Sarreyer 2'300 m (rLu).

Hirondelle de rivage, *Uferschwalbe*: l'espèce pourrait bien s'installer dans le Chablais, même si aucun trou n'a pu être découvert suite à l'observation du 2.7 au Bouveret (beP, paB, rV, R. Delseth). — **Hirondelle de rochers, *Felsenschwalbe***: 1 c. niche sur le fort de Saint-Maurice et 1 autre sur un chalet de bois à Liddes 1'260 m (gaD, jeF, beP); dans le Haut-Valais, signalée le 28.7 dans le Lötschental à 2'100 m (L. Graber) et le 17.8 sur Zermatt à 2'220 m et 2'300 m (jcT). — **Hirondelle de fenêtre, *Mehlschwalbe***: nourrit encore au nid le 16.9 à Zermatt (jS).

Pipit rousseline, *Brachpieper*: à Leuk, une nidification certaine (1 c. avec 3 j.; E. Baader), une probable et une possible (M. Camici, Zur). — **Bergeronnette printanière, *Schafstelze***: 3 territoires à Vouvry, 1 à Vionnaz (liM, beP, ES), 3 à Leuk (M. Camici, L. Schifferli) et 3 à Gampel (beP, Sal).

Cincle, *Wasseramsel*: en plaine, 1 ch. le 29.3 près de Brig et 1 ind. le 9.4 à Visp (Zur); 2 le 26.6 à Leuk (M. Camici); en altitude, des isolés le 20.6 au-dessus de Naters à 2'150 m et 2'320 m (mEi) et le 29.7 à Kumminalp 2'400 m (L. Graber).

Accenteur alpin, *Alpenbraunelle*: notamment 1 c. le 2.8 sur Evolène 3'300 m et 2 ad. avec au moins 1 j. le 17.8 sur Zermatt 3'230 m (jcT), 1 ad. avec de la nourriture le 29.7 sur Leukerbad 3'000 m (L. Graber) et une 10^e d'ind., dont des ch., le 4.8 sur Ergisch 3'050 m (tWy).

Rossignol, *Sprosser*: toujours bien répandu dans le Haut-Valais, jusqu'à Bitsch, où des ch. d'altitude sont à nouveau notés: Ausserberg 1'020 m (F. Borleis) et Mund 900 et 1'150 m (mEi). — Une mention surprenante de **Gorgebleue, *Blaukehlchen***, le 30.5 à Ausserberg avec au moins 1 ind. (Ker). — Les recherches pour l'Atlas ont apporté beaucoup de données inédites pour le **Traquet tairier, *Braunkehlchen***, à plus de 2'000 m principalement: Bourg-Saint-Pierre, Evolène, Grimentz, Ayer, Leukerbad, Kippel, Visperterminen, Brig-Glis, Ried/Mörel et Greich, jusqu'à 2'200 m en plusieurs endroits (jcT, mEi, Gun, tWy); dans le Chablais, 7 territoires en plaine à Collombey le 2.7 (beP) et 26 ind., avec nourrissage observé, sur 1 km² le 25.5 sur Vouvry 1'550 m (jcT). — **Traquet pâtre, *Schwarzkehlchen***: en aval de Sierre, 1 ch. le 2.7 à Vionnaz, 1 famille à Dorénaz le 24.8 et une nidification probable et 1 m. solitaire à Martigny (beP); 2 c. à Ardon (gaD) et 1 c. en mars à Sion (rA). — **Traquet motteux, *Steinschmätzer***: quelques recensements de nicheurs: 8 territoires le 28.6 sur Leukerbad entre 2'250 et 2'350 m et 12 le 29.6 sur Albinen entre 2'300 et 2'400 m (Gun). — **Merle de roche, *Steinrötel***: dans la partie romande du canton, 1 c. à Bourg-Saint-Pierre le 13.7 (jcT), un ad. avec becquée à Mauvoisin le 4.7 (rLu, L. Camenzind) et 1 ch. et 1 c. à mi-juillet à Loveigno/Saint-Martin (Gey). — **Merle à plastron, *Ringamsel***: indices de nidification les plus élevés: 1 ad. et 2 j. sur Oberwald 2'500 m le 20.7 (J. Bolliger) et 1 famille le 27.7 sur Bürenchen 2'520 m (Sal).

Rousserolle turdoïde, *Drosselrohrsänger*: 1 c. en mai-juin à Leuk (liM, beP, pUn) a dû changer d'endroit suite à des transformations illégales de son site de nidification habituel. — **Hypolaïs polyglotte, *Orpheusspötter***: également présent à Port-Valais, Monthey (beP) et Grimsuat (2 ch.; aSi) et près de Feschel 900 m (R. Muheim). — **Fauvette babillarde, *Klappergrasmücke***: jusqu'à 2'150 m sur Albinen (mEi). — **Fauvette grisette, *Dorngrasmücke***: une nouvelle fois, très peu

de données: 1 ch. en mai à Fully (liM, beP), en juin à Leuk (Rey), puis le 16.5 à Gampel (M. Iseli) et Mund (mEi).

Grimpereau des bois, *Waldbaumläufer*: des mentions de basse altitude, avec 1 ch. le 16.5 à Fully 650 m et 3 ch. dans la hêtraie à Massongex dès 530 m le 18.5 (jeF).

Loriot, *Pirol*: en dehors du Chablais et du Haut-Valais, 1 ch. le 16.5 à Finges (rLu).

Pie-grièche écorcheur, *Neuntöter*: en plaine, hors Haut-Valais, 1 c. nourrit le 14.8 à Vionnaz (ES), 5 territoires à Martigny, 1 à Saillon, 1 famille à Aproz au bord du Rhône le 9.7 (beP) et 1 ad. nourrit 2 j. le 15.8 à Sion (aLu). En montagne, présence normale à Vex, Hérémenche, Evolène et aux Mayens de Conthey (Gey); à noter, 1 ch. le 30.5 sur Gampel 2'280 m (S) et 1 m. chasse à 2'300 le 8.7 sur les Mayens de Conthey (Gey). — **Pie-grièche à tête rousse, *Rotkopfwürger*:** 1 c. nourrit 2 j. le 4.8 à Grimisuat (beP, L. Willenegger) et 1 c. cantonné à Arbaz (G. Daendliker, aSi).

Chocard, *Alpendohle*: une nidification réussie à Sion 490 m (aSi), preuve la plus basse pour la Suisse. — **Choucas, *Dohle*:** 5 c. le 1.7 à Saint-Maurice (beP), 5 ad. en été à Leukerbad (Gun) et 3 nidifications certaines et 5 probables à Brig-Glis (mEi).

Niverolle, *Schneefink*: notamment 3 le 21.4 à Bagnes 3'620 m (R. Graf) et 5 sur Vouvry 2'430 m le 19.6 (Str).

Serin, *Girlitz*: 1 ch. le 16.7 au-dessus de Vichères/Liddes 1'610 m (beP). — **Tarin, *Erlenzeisig*:** nidifications certaines au-dessus de Martigny (rA), à Bourg-Saint-Pierre (jeT) et sur Naters (mEi). — **Sizerin, *Birkenzeisig*:** à nouveau signalé en plaine à Fully (2 c.; beP). — **Beccroisé, *Fichtenkreuzschnabel*:** beaucoup signalé, et notamment des nidifications certaines dans le Haut-Valais: Leukerbad, Lötschen, Unterbäch, Bürchen, Ried/Mörel et Blatten (J. Denking, mEi, Sal, jeT). — **Grosbec, *Kernbeisser*:** des indices possibles ou probables à Grône, Finges, Viège, Lalden, Mund, Brig et Greich (mEi, Zur).

Bruant jaune, *Goldammer*: 1 ch. le 1.7 à Evionnaz 450 m (beP). — **Bruant zizi, *Zaunammer*:** dans le Bas-Valais, des ch. à Vérossaz, Evionnaz 470 m (beP), Chemin-Dessus/Martigny, Ayent et Icoigne (aSi). — **Bruant fou, *Zippammer*:** parmi les indices de nidification, à noter, 1 ind. le 5.7 à Tanay/Vouvry 1'480 m (Str), l'une des rares mentions en aval de Vernayaz. — **Bruant ortolan, *Ortolan*:** en dehors du coteau haut-valaisan, des ch. sont notés le 16.5 à Finges (rLu), le 27.6 à Obergesteln (tWy) et 3 le 30.6 à Zermatt (Zur). — **Bruant des roseaux, *Rohrammer*:** niche toujours dans les blés à Gampel (beP). — **Bruant proyer, *Grauammer*:** 15 ch. répartis sur les communes d'Agarn, Leuk et Gampel (liM, Sal, Zur, ...).

L'AUTOMNE 1993

Les **précipitations diluviennes de septembre et d'octobre** ont entraîné des crues du Rhône qui ont marqué une nouvelle fois le Valais: elles ont été supérieures aux normes de 300 à 450% en septembre et de 50 à 180% en octobre! Les conséquences sur les migrateurs ont elles aussi été considérables puisque le Valais est apparu pour beaucoup comme un cul-de-sac: les **cols alpins sont restés bouchés** durant de longues périodes, bloquant notamment des quantités d'hirondelles qui ont exercé une pression soutenue sur une nourriture de plus en plus rare ... Seuls les Faucons hobereaux ont pu profiter des faiblesses de leur garde-manger ambulant! Les pertes ont probablement dû être importantes pour tous les affamés et les **attardés affaiblis**, dans les insectivores principalement: Hirondelle de rivage, Rougequeue à front blanc, Gobemouche noir. Cet automne a cependant aussi connu ses **invasions**, comme pour l'**Alouette lulu** ou le **Geai**, et ses **absences**, comme pour la **Grive mauvis**.

Für die Hauptschlagzeilen im September und Oktober 1993 sorgten die enormen Niederschläge (300-450% der Norm im September und 50-180% im Oktober), welche die Rhone über die Ufer treten liessen. Die Auswirkungen auf die Durchzügler waren beträchtlich, denn das Wallis bildete für viele eine Sackgasse: **Die Alpenpässe blieben lange bedeckt**, was insbesondere zahlreiche Schwalben blockierte, welche nur ein stetig knapper werdendes Futterangebot vorfanden. Einzig die Baumfalken konnten von der Schwäche ihrer Beutetiere profitieren. Die Verluste unter den entkräfteten und verspäteten Durchzüglern waren wahrscheinlich hoch, so bei der Uferschwalbe, dem Gartenrotschwanz und dem Trauerschnäpper. Dieser Herbst fiel auch durch einen starken Einflug von **Heidelerchen** und **Eichelhähern** und durch das **Fehlen der Rotdrossel** auf.

Grèbe castagneux, Zwergtaucher: premier migrateur le 27.7 à Martigny (beP).

Cormoran, Kormoran: déjà 15 ind. observés le 17.9 à Fully (S), puis à Bretolet, 40 le 16.10, 20 le 26 et 23 le 29 (Leu); dans la région de Martigny, 1 les 1^{er} et 11.11 (jeF, beP) et 6-7 à Grône les 17 et 21.10 (iSi).

Blongios, Zwergreihher: dernier le 10.9 à Grône (jcT). — **Bihoreau, Nachtreiher:** signalé à Leuk uniquement, le 11.8 et les 4-10-12.9 (Rey, jcT). — **Aigrette garzette, Seidenreiher:** découverte surprenante d'un oiseau le 20.11 à Fully, probablement tiré (mD; homologué CAVS); une des mentions les plus tardives pour la Suisse. Cette observation est certainement à mettre en relation avec celle du 19.11 à Noville VD (rV).

Cigogne noire, Schwarzstorch: 1 migratrice le 9.10 à Bretolet (Leu). — **Cigogne blanche, Weissstorch:** 12 ind. en vol le 26.8 à Monthey (phB).

Canard siffleur, Pfeifente: 1 le 12.10 à Grône (Rey). — **Canard chipeau, Schnatterente:** 2 le 17.10 à Grône (iSi). — **Sarcelle d'hiver, Krickente:** 3 isolés passent entre le 18.8 et le 2.9 à Martigny (beP). — **Sarcelle d'été, Knäkente:** 3 le 17.8 à Martigny (beP) et 5 le 10.9 à Grône (jcT). — **Canard souchet, Löffelente:** 2 f. le 4.10 à Grône (aLu, aSi). — **Nette rousse, Kolbenente:** à nouveau présente au Bouveret: 1 ind. le 3.9 (beP). — Un **Fuligule milouin, Tafelente**, les 4, 10 et 23.10 à Grône (aLu, Rey, aSi) puis le 3.11 à Leuk (Rey).

Bondrée, Wespenbussard: la migration transalpine est observée dans le Turtmanntal le 19.9 et au Petit Col Ferret le 21.9, où 14 oiseaux passent entre 13 et 16h (rLu). — **Milan noir, Schwarzmilan:** dernier migrateur, le 21.9 sur le Petit Col Ferret à plus de 3'500 m (rLu, aSi). — **Milan royal, Rotmilan:** dans le Bas-Valais uniquement, entre le 4.10 à Collombey (beP) et le 27.10 à Monthey (rV); des attardés, ou des hivernants probables, sont observés le 14.11 à Vionnaz (beP) et le 28.11 sur Martigny-Croix (2 ind.; cK). — **Gypaète, Bartgeier:** 13 observations très dispersées entre Collonges et Zermatt (G); un seul petit séjour de République 5 entre le 30.8 et le 11.9 dans la région des Dents de Morcles-Fully-Ovronnaz (G). — Le **Busard des roseaux, Rohrweihe** n'est signalé isolément que le 3.8 à Leuk (Rey), le 25.9 à Martigny et le 4.10 à Vouvy (beP), en dehors du haut val d'Illiez; dernier le 28.10 au col de Bretolet (Leu). — **Busard Saint-Martin, Kornweihe:** en novembre, 2 ind. le 14 à Vionnaz (rV) et 1 le 28 à Collombey-Muraz (ES). — **Busard cendré, Wiesenweihe:** 4 migrateurs au col de Bretolet, les 14 et 16.9 puis les 1^{er} et 3.10 (Leu). — **Autour, Habicht:** un migrateur transalpin a également été observé le 21.9 au Petit Col Ferret (rLu, aSi). — **Epervier, Sperber:** migre les 31.8 et 21.9 au Petit Col Ferret (rLu, aSi).

Balbuzard, Fischadler: à Bretolet, au moins 18 ind. entre le 5.9 et le 9.10 (div. obs.); ailleurs, 1 seul migrateur observé, le 24.9 à Martigny (phB).

Faucon kobez, Rotfussfalke: 1 juv. le 28.9 à Vionnaz (phB, beP). — **Faucon émerillon, Merlin:** premier le 24.9 à Martigny (beP), puis le 25 à Bretolet (Leu);

ailleurs, vu le 4.10 à Vouvry et le 14.11 à Vionnaz (beP, rV). — **Faucon hobereau, Baumfalke**: les intempéries de la dernière décade de septembre ont bloqué beaucoup de migrateurs par groupes de 3 ou 4 ind. parfois; les hirondelles, que le froid engourdisait et qui souffraient du manque de nourriture, ont été des proies faciles. Au total, 11 dates pour 17 ind. entre le 18.9 et le 5.10; le dernier, le 14.10 à Grône, capture une Noctule (aLu).

Gelinotte, Haselhuhn: le 5.10 sur Trient (rLu, aSi) puis 2 ind. le 18.10 sur Orsières et en octobre et décembre sur Evionnaz (jcT). — **Lagopède, Alpenschneehuhn**: vu cet automne sur Liddes, Evolène et Grimentz (jcT) et au lac de Servay/Bagnes (eRe). — **Tétras-lyre, Birkhuhn**: observé sur Vouvry, dans le val d'Illiez, sur Evionnaz, Orsières, dans le val de Bagnes (jcT) et sur Hérémente (Rey); max. de 16 à Bretolet (Leu).

Petit Gravelot, Flussregenpfeifer: 2 migrateurs seulement, le 10.7 à Visp (Ker, Zur). — **Grand Gravelot, Sandregenpfeifer**: 2 observations à Vouvry, les 18.9 et 21.10 (Ph. Bruchez, beP, eRe). — **Vanneau, Kiebitz**: passage à nouveau très maigre: 2 le 14.10 à Martigny et une 20^e le 14.11 à Vionnaz (beP).

Bécasseau minute, Zwergstrandläufer: 1 migrateur le 9.10 au col de Bretolet (Leu). — **Bécasseau variable, Alpenstrandläufer**: 2 ind. le 18.9 au Bouveret et 1 le 4.10 à Vouvry (beP). — **Bécassine des marais, Bekassine**: à début octobre seulement, le 4 à Leuk (rLu) et les 6-7 à Martigny (beP). — **Barge à queue noire, Uferschnepfe**: 1 migratrice le 9.10 au col de Bretolet (Leu), la première en ce lieu? — **Chevalier arlequin, Dunkler Wasserläufer**: 1 juv. le 18.9 à Vouvry (Ph. Bruchez, beP, eRe). — **Chevalier aboyeur, Grünschenkel**: 2 le 9.10 à Bretolet (Leu). — **Chevalier culblanc, Waldwasserläufer**: de retour le 22.6 à Martigny (beP) et le 30 à Leuk (Rey); deux migrateurs transalpins isolés, le 31.8 sur Grimentz 2'330 m et le 12.9 sur le val Ferret 2'420 m (jcT). — **Chevalier sylvain, Bruchwasserläufer**: 2 le 10.7 à Visp (Ker, Zur) puis 1 le 2.9 à Martigny (beP) et le 3.10 à Bretolet (Leu). — **Chevalier guignette, Flussuferläufer**: un migrateur hâtif le 1.7 à Monthey (beP).

Mouette rieuse, Lachmöwe: notamment 13 le 13.8 à Leuk (Rey) et 1 le 28.11 à Lens (iSi). — Une observation surprenante pour le **Goéland brun, Heringsmöwe**: 10 ind. passent le col de Bretolet le 27.9 (Leu)! — **Goéland leucophaée, Weiskopfmöwe**: 1 ind. le 22.9 au col de Bretolet (Leu).

Pigeon colombin, Hohлтаube: notamment 7 le 4.10 à Muraz (beP). — **Pigeon ramier, Ringeltaube**: à nouveau de grands groupes dans le Chablais, avec 250 ind. le 18.9 à Vionnaz et 400 le 4.10 à Muraz (Ph. Bruchez, beP, eRe). — **Tourterelle des bois, Turteltaube**: dernière le 8.10 à Martigny (beP).

Coucou, Kuckuck: 1 migrateur d'altitude le 2.8 au Grand Cornier/Bricola 2'780 m (jcT), puis dernier le 19.9 à Martigny (beP).

Chouette effraie, Schleiereule: 3 j. provenant du centre de soins d'Etoy ont été lâchés le 29.9 à Martigny (rA).

Chouette chevêchette, Sperlingskauz: entendue le 20.10 sur Evionnaz (jcT) et Martigny (beP). — **Chouette de Tengmalm, Rauhfusskauz**: 13 captures à Bretolet (Leu).

Martinet noir, Mauersegler: également retenu par les intempéries de la fin septembre et du début d'octobre: 5 données de plaine sont postérieures 15.9, la dernière le 14.10 à Grône (aLu). — **Martinet à ventre blanc, Alpensegler**: max. d'une 30^e le 18.9 (cK) et dernier le 6.10 à Martigny (beP).

Torcol, Wendehals: dernier le 27.9 à Martigny (Ch. Meisser).

Pic tridactyle, Dreizehenspecht: à nouveau signalé! 2 ind. le 13.11 au-dessus de Monthey 1'600 m (jcT).

- Alouette lulu, Heidelerche:** plus d'observations que de coutume, ce qui est conforme au mouvement enregistré au niveau national: notamment 25 le 10.10, 30 le 14 et 100 le 16 au col de Bretolet (Leu); à Martigny, 2 le 3.10, puis 1 le 22 et le 31 (beP).
- Hirondelle de rivage, Uferschwalbe:** dernière le 6.10 à Martigny (beP). — **Hirondelle de cheminée, Raubschwalbe:** mêlée à l'Hirondelle de fenêtre, c'est un groupe d'env. 10'000 ind. qui est bloqué le 24.9 à Martigny (beP).
- Pipit rousseline, Brachpieper:** une seule donnée, le 16.9 à Bretolet (Leu). — **Pipit des arbres, Baumpieper:** dans les dates normales, dernier le 13.10 à Martigny (beP). — Arrivage massif du **Pipit farlouse, Wiesenpieper:** premier à Martigny le 1.10, et déjà 150 ind. le lendemain (beP). — **Bergeronnette printanière, Schafstelze:** du 25.8 au 24.10 à Martigny (beP).
- Cincle, Wasseramsel:** 4 ind. les 29.11 et 6.12 sur le Trift/Zermatt 2'340 m avec un peu de neige et de glace (jS).
- Accenteur alpin, Alpenbraunelle:** le plus grand groupe: 23 ind. le 5.9 dans le val Ferret 2'500 m (paB, beP, eRe).
- Rougequeue à front blanc, Gartenrötel:** dernier attardé le 31.10 à Martigny (beP). — **Traquet tavier, Braunkehlchen:** passe du 26.7 au 24.10 à Martigny (beP); en altitude, des migrateurs sont notés le 16.8 à 2'400 m sur le Catogne/Orsières (beP) et le 21.8 au Simplon 2'200 m (tWy). — **Traquet pâtre, Schwarzkehlchen:** premier migrateur le 27.7 à Martigny (beP) et dernier le 7.11 à Ausserberg (tWy); à noter un ind. le 26.9 à Zermatt (jS). — **Traquet motteux, Steinschmätzer:** entre le 1.8 à Leuk et le 24.10 à Martigny (beP); des grands groupes, nicheurs et migrateurs confondus, sont observés en altitude, notamment 60 ind. le 12.9 dans le val Ferret (jcT). — **Merle de roche, Steinrötel:** 1 le 12.9 dans le val Ferret (jcT). — **Grive mauvis, Rotdrossel:** 1 le 31.10 à Martigny (beP).
- Locustelle tachetée, Feldschwirl:** en mouvement dès le 1.8 à Gampel (beP). — **Rousserolle effarvatte, Teichrohrsänger:** dernière le 13.10 à Martigny (beP). — **Hypolaïs icterine, Gelbspötter:** une capture le 16.9 à Bretolet (S. Birrer). — Dernier **Pouillot siffleur, Waldlaubsänger,** un attardé le 15.9 à Martigny (beP). — **Pouillot fitis, Fitis:** passe entre le 26.7 et le 3.10 à Martigny (beP); dernier ch., le 6.10 à Leuk (Rey).
- Gobemouche noir, Trauerschnäpper:** 1 attardé affaibli le 14.10 à Martigny (beP).
- L'invasion de **Mésanges noires, Tannenmeisen** remarquée un peu partout en Suisse cet automne n'est pas documentée pour le Valais: seules trois troupes de 7 à 15 ind. ont été observées dans le val Ferret le 5.9 à 2'200 m volant vers le NW (paB, beP, eRe)!
- Tichodrome, Mauerläufer:** notamment 1 ind. sur Fionnay le 21.11 à 2'180 m (beP).
- Mésange rémiz, Beutelmeise:** passage régulier entre le 25.9 et le 31.10 à Martigny (beP); 2 les 29.9 et 6.10 à Leuk (Rey) puis 4 le 14.10 à Grône et 1 ind. dans les filets au col de Bretolet le 16.10 (Leu).
- Pie-grièche écorcheur, Neuntöter:** 3 attardées en octobre à Martigny, la dernière jusqu'au 22 (beP). — **Pie-grièche grise, Raubwürger:** une tentative d'hivernage d'un ind. à Vionnaz entre le 15.10 et le 14.11 (beP, ES, rV, ...).
- Les **Geais, Eichelhäher** ont envahi la Suisse cet automne par des mouvements de grande ampleur; en Valais, on les trouve isolément ou par petits groupes dans presque tous les milieux, en ville comme à la campagne, mais sans atteindre cependant les dimensions observées sur le Plateau (jusqu'à plus de 100 ind. ensemble). A Martigny, un passage régulier est noté en septembre-octobre avec un groupe max. de 16 ind. le 6.10. — **Cassenois, Tannenhäher:** en plaine, 1 le 3.9 à Saint-Maurice et 3 le 8 à Fully (beP). — **Crave, Alpenkrähe:** 2 ind. passent tout l'automne sur les hauts d'Ardon (gaD). — **Choucas, Dohle:** déjà 4 ind. le 21.7 à Fully puis 12 le 8.8

à Leuk (beP). — **Corbeau freux, *Saatkrähe***: 18 migrants hâtifs le 5.10 au col de Balme (rLu, aSi). — **Corneille mantelée, *Nebelkrähe***: 1 le 4.10 à Leuk (rLu).
Pinson du Nord, *Bergfink*: premier le 2.10 à Martigny (beP). — **Beccroisé, *Fichtenkreuzschnabel***: au moins 3 ind. le 14.11 à Port-Valais 380 m (beP). —
Roselin, *Karmingimpel*: 1 juv. capturé le 24.9 à Bretolet (Leu, R. Winkler), homologué par la CAVS.
Bruant ortolan, *Ortolan*: dernier le 27.9 à Martigny (Ch. Meisser). — **Bruant proyer, *Graumammer***: passe entre le 6.10 à Martigny et le 6.11 à Collombey (beP).

ESPÈCES EXOTIQUES

Perruche à collier, *Halsbandsittich*: 1 couple échappé de volière en septembre 1990 s'est implanté dans un vieux marronnier de la CIBA de Monthey. Depuis 1991, ce couple élève 1 à 3 jeunes et semble être bien adapté à ces nouvelles conditions! (R. Bérodot). A Sion, 2 ind. sont cantonnés aux alentours de la colline des Potences depuis mai 1993; ils se nourrissent de fruits, des cerises en juin jusqu'aux pommes pourries en décembre (rLu). Assistons-nous à une prolifération de cette espèce chez nous, comme elle l'a déjà fait en Grande-Bretagne, en Allemagne, au Pays-Bas et en Belgique?

N'ont pas pu être pris en compte dans ce rapport:

Les observations suivantes ont été rejetées par la Commission de l'Avifaune Suisse (CAVS)^{13,10}:

Elanion blanc, *Gleitaar*: 1 ind. le 23.6.1991 à Fully. — **Aigle criard, *Schelladler***: 1 ad. le 21.9.1992 au col de Cou/Champéry.
Chevalier stagnatile, *Teichwasserläufer*: 1 ind. le 9.8.1992 à Leuk.
Hirondelle rousseline, *Rötelschwalbe*: 1 ind. le 14.4.1992 à Grône.
Alouette calandre, *Kalanderlerche*: 1 ind. le 3.5.1991 à Sierre.
Fauvette à lunettes, *Brillengrasmücke*: 1 ch. le 17.5.1992 à Leuk.

Errata à la dernière chronique¹¹

Indices de nidification 1990

p. 51: sous **Pie-grièche à tête rousse**: nidification *probable* à Grimisuat (LM, AS, AL) et *certaine* à Arbaz (LM).

Bibliographie

1. BAUMANN, Ph. & B. POSSE. 1992. Plumes de Râle des genêts dans un nid de Moineau friquet. *Nos Oiseaux* 41: 490.
2. BILLE, R.-P. 1992. Grand Butor en escale dans les Alpes en Valais. *Nos Oiseaux* 41: 447.
3. FOURNIER, J. 1993. Nidification de la Pie-grièche à tête rousse à Vérossaz (Bas-Valais). *Nos Oiseaux* 42: 98-99.
4. GÉROUDET, P. 1991. Le système hivernal du Grand Cormoran dans le haut bassin du Rhône. *Nos Oiseaux* 41: 145-164.
5. GÉROUDET, P. 1991. Chronique ornithologique romande: l'automne 1990 et l'hiver 1990-91. *Nos Oiseaux* 41: 251-267.

6. GÉROUDET, P. 1992. Chronique ornithologique romande: le printemps et la nidification en 1991. *Nos Oiseaux* 41: 375-391.
7. GÉROUDET, P. 1992. Chronique ornithologique romande: l'automne 1991 et l'hiver 1991-92. *Nos Oiseaux* 41: 495-512.
8. GÉROUDET, P. 1993. Chronique ornithologique romande: le printemps et la nidification en 1992. *Nos Oiseaux* 42: 103-119.
9. MAUMARY, L. *et al.* 1993. Le Roselin cramoisi nicheur à la Vallée de Joux (Juras vaudois) et rétrospective de la progression de l'espèce en Suisse. *Nos Oiseaux* 42: 143-157.
10. MOSIMANN, P. 1993. Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 1992. Rapport de la Commission de l'avifaune suisse (CAvS). *Nos Oiseaux* 42: 211-223.
11. POSSE, B. 1992. Chronique ornithologique valaisanne pour les années 1989 et 1990. *Bull. Murithienne* 110: 37-55.
12. TURRIAN, F. 1993. La saison ornithologique au col de Bretolet en 1992. *Nos Oiseaux* 42: 61-70.
13. UNDELAND, P. & H. LEUZINGER. 1993. Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 1991. *Nos Oiseaux* 42: 29-38.
14. VITTOZ, P. 1992. Un Labbe à 2350 m en Valais. *Nos Oiseaux* 41: 372.
15. VOISIN, R. 1991. Passage élevé de Cormorans et de Vanneaux au-dessus de la vallée du Rhône à Monthey, Valais. *Nos Oiseaux* 41: 62-63.

ANNEXE: COMPTAGE DE RAPACES AU COL DE BRETOLET EN 1992

période du 31.8 au 19.10

tableau d'après le résumé de Didier Baud (dBd)

Espèces, Arten	Passage, Zug	Maxima	Total
Bondrée, <i>Wespenbussard</i>	31.8 – 14.10	40 le 20.9	252
Milan noir, <i>Schwarzmilan</i>	31.8 – 18.9	10 le 31.8	23
Milan royal, <i>Rotmilan</i>	9.9 – 13.10	16 le 8.10	42
Busard des roseaux, <i>Rohrweihe</i>	31.8 – 16.10	30 le 19.9	262
Busard Saint-Martin, <i>Kornweihe</i>	8.9 – 16.10	3 fois 2 ind., <i>dreimal 2 Ex.</i>	15
Busard cendré, <i>Wiesenweihe</i>	1 les 4 et 8.9	—	2
Busard ind., <i>unbest. Weihe</i>	6.9 – 25.9	2 le 25.9	4
Autour, <i>Habicht</i>	13.9 – 19.10	3 le 15.9	10
Epervier, <i>Sperber</i>	2.9 – 19.10	59 le 8.10	261
Buse, <i>Mäusebussard</i>	6.9 – 19.10	52 le 24.9	226
Balbusard, <i>Fischadler</i>	10.9 – 5.10	11 le 19.9	27
Faucon crécerelle, <i>Turmfalke</i>	8.9 – 18.10	50 le 29.9	221
Faucon émerillon, <i>Merlin</i>	5.10 – 16.10	—	7
Faucon hobereau, <i>Baumfalke</i>	31.8 – 5.10	16 le 18.9	85
Rapaces ind., <i>unbest. Raubvögel</i>	31.8 – 13.10	3 le 16.9	13
Total			1450